

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

BC-1000[®] DUST

(ÁCIDO ASCÓRBICO, BIOFLAVONOIDES CÍTRICOS,
ÁCIDOS CÍTRICO Y AZÚCARES)

POLVO SECO (DP)

Composición Química:

Cada 100g de BC-1000[®] DUST contiene:

- Biomasa cítrica

15% p/p

- Aditivos c.s.p.

100% p/p

FUNGICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

PBUA N° 187 - SENASA

Titular de Registro: **Chemie Agroveterinaria[®] S.A.C.**

Av. Tomas Ramsey N°. 930 Oficina 905

Magdalena del Mar, Lima 17 - Perú

Teléfono: (51-1) 4937980

Formulador: **Chemie[®] S.A.**

Suecia 172 piso 1 y 2, Providencia, Santiago – Chile.



Importador y Distribuidor: **Chemie Agroveterinaria[®] S.A.C.**

Av. Tomas Ramsey N°. 930 Oficina 905

Magdalena del Mar, Lima 17 - Perú

Teléfono: (51-1) 4937980

Contenido Neto : **18 Kg**

N° de Lote :

Fecha de Formulación :

Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

BC-1000® Dust es un producto de baja toxicidad, no corrosivo, no volátil, no explosivo, no irritante, inodoro. Sin embargo, se recomienda lo siguiente:

- Protejase los ojos al momento de aplicarlo.
- No comer, beber o fumar durante el uso del producto.
- Durante la aplicación usar equipo de protección como botas, guantes, pechera, protector facial, que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo.
- Se recomienda guardar el producto en su envase original, en un lugar seco, fresco y exclusivo para productos fitosanitarios.
- No reutilice los envases vacíos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Los síntomas de intoxicación son dolor de cabeza y malestar general.

Si el contacto es por vía dermal: Se debe remover la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón neutro la zona afectada, incluyendo pelo y uñas.

Si el contacto es por vía ocular: Quitar lentes de contacto, ya sean ópticos o de contacto y luego mantener los párpados abiertos para lavar con abundante agua por al menos 15 minutos.

Si el contacto es por vía oral: No inducir vómito, en primera instancia dirigirse al Servicio de Salud más cercano o consultar a un centro de información Toxicológica.

Si el contacto es por inhalación: Trasladar al paciente al aire libre, lejos del área contaminada y dejar en reposo. Conseguir atención médica y si se hace dificultosa la respiración dar oxígeno y ventilación.

En caso de intoxicación: mostrar la etiqueta, el folleto o el envase al personal de salud.

NOTA AL MÉDICO:

No inducir al vómito, administrar carbón activado (o medicinal), diluidos en 4 partes de agua tibia hasta obtener consistencia de sopa espesa.

ANTÍDOTO: No tiene antídoto específico.

TELÉFONO DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 CHEMIEAGROVETERINARIA: 511- 714 1788

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- **BC 1000® DUST** es un producto natural de baja toxicidad a organismos acuáticos, aves y abejas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BC-1000® Dust es un fungicida natural de amplio espectro, cuyos ingredientes activos provienen de extractos de cítricos y actúa alterando la membrana celular e inhibiendo la respiración celular. También estimula el sistema de defensa de las plantas promoviendo la síntesis de fitoalexinas.

Tiene una probada eficacia en el control de Pudrición gris causada por *Botrytis cinerea* y Pudrición ácida causada por un complejo de microorganismo como hongos, bacterias y levaduras en los frutos de la vid.

BC-1000® Dust está exento de tolerancias y por lo tanto no debe de cumplir con un período de carencia a la cosecha. Posee un marcado efecto residual que está en función de la presión del patógeno así como de las condiciones medioambientales.

BC-1000® Dust posee una formulación homogénea de ingredientes activos e inertes con un adecuado tamaño de partículas y fluidez que facilitan su manipulación y aplicación. **BC-1000® Dust** es un producto que puede ser vertido directamente a las espolvoreadoras para su aplicación.

La aplicación se efectúa mediante espolvoreadoras directamente sobre el área deseada.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Las aplicaciones puede realizarse desde plena floración hasta cosecha de forma preventiva ante la presencia de condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad o curativa ante la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda el uso **BC 1000® DUST** de en tratamientos preventivos y curativos con intervalos de 7 y 10 días.

Vid, paltos y mandarina: por ser un producto orgánico natural, puede ser usado en precosecha y cosecha sin problemas de residuo y generación de resistencia.

PERIODO DE REINGRESO:

No existe restricción en cuanto al tiempo que deba mediar entre la aplicación e ingreso de personas animales al campo tratado, siembra o plantación del cultivo siguiente, ni los frigoríficos, cámaras u otros medios de almacenamiento, pues el producto no deja residuos por ser todos sus componentes de origen natural, sin embargo se recomienda esperar 4 horas.

COMPATIBILIDAD:

Por tipo de formulación, el producto es compatible con azufre. Para otras mezclas de productos de formulación polvo se recomienda hacer pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No se tienen reportes de toxicidad en plantas y no se presentan de seguir las recomendaciones de la etiqueta

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Enfermedad		Dosis kg/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
VID	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	20 - 23	0	NA
	Pudrición ácida	<i>Botrytis cinerea, Penicillium expansum, Aspergillus niger, Alternaria alternata, Cladosporium herbarum</i>	20 - 23	0	NA
PALTOS	Moho negro	<i>Cladosporium sp</i>	18	0	NA
MANDARINO	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	18	0	NA

PC : Período de carencia
LMR : Límite máximo de residuos
NA : No aplica

Se recomienda el uso de **BC-1000® Dust** dentro de un programa de manejo integrado de la enfermedad que incluya, prácticas culturales y rotación de fungicidas de distinto de modo de acción y diferente composición, para evitar la aparición de cepas resistentes.

