

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”



AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Pythium oligandrum (Mínimo 1 millón de oosporas/g) Mín. 100 g/Kg

Aditivos c.s.p. 1Kg

Reg. N° 090-SENASA-PBA-ACBM



Titular de Registro, Importado y

Distribuido por:

POINT ANDINA S.A.

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.

Santiago de Surco, Lima – Perú.

Teléfono +51 (01) 348 1018

Formulado por:

BIOPREPÁRÁTY, spol. S R.O.,

Tylišovská 772/1, 160 00 Praha 6,

Czech Republic

Contenido Neto: 100g

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con agua por 15 a 20 minutos, remover los lentes de contacto si los hubiera. Si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no inducir al vómito, beber y enjuagar la boca con abundante agua. No administrar nada a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y enjuagar la piel con abundante agua por 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar ventilado. Si la persona tiene dificultad para respirar, dar respiración artificial. En caso de emergencias llamar a:

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106;

POINT ANDINA S.A.: (01) 348 1018; CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa contándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contamine las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

EL DORADO® POLYVERSUM es un fungicida biológico con acción de contacto para el control de un amplio espectro de patógenos.

EL DORADO® POLYVERSUM coloniza el ecosistema de la planta a través de 3 mecanismos de acción: micoparasita al patógeno, induce resistencia de la planta mediante la producción de oligandrina y estimula su crecimiento mediante la producción de triptamina.

Para su aplicación, agitar el sobre y mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con mochila mecánica o a motor.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda 2 aplicaciones por campaña/año, considerando una campaña al año, aplicar cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad en los cultivos de arándano, vid y fresa. Para el cultivo de pimiento, se recomienda 2 aplicaciones por campaña/año, considerando 10 días entre aplicaciones, a pH 6.5 - 7. Para el cultivo de alcachofa, se recomienda 2 aplicaciones por campaña/año, considerando 10 - 15 días entre aplicaciones, a pH 6.5 - 7. Para el cultivo de palto, se recomienda 2 aplicaciones/campaña en la etapa de floración, considerando 1 campaña/año y un intervalo de 15 días entre aplicaciones. El gasto de agua es de 1000 - 1200 L/ha, con un valor pH 7. En el caso del cultivo de granado, se recomienda 2 aplicaciones/campaña considerando 1 campaña/año y un intervalo de 15 días entre aplicaciones, a pH 6.5 - 7.0.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingrese a las áreas tratadas durante una hora después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los plaguicidas, con excepción de los que tienen reacción alcalina. No mezclar con fungicidas.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	Kg/200L		
Arándano	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3 - 0.4	-	N.A.	N.A.
Vid	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.06 - 0.08	N.A.	N.A.
Fresa	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.1	-	N.A.	N.A.
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.25 - 0.3	-	N.A.	N.A.
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.25 - 0.3	-	N.A.	N.A.
Palto	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3 - 0.4*	-	N.A.	N.A.
Granado	Alternaria	<i>Alternaria alternata</i>	0.4	-	N.A.	N.A.

P.C.: Período de Carenacia. | N.A.: No Aplica | L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (partes por millón). | *Gasto de agua: 1000 - 1200 L/ha

