

Longitud Total 28.9 cm.

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No coma, beba, ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas y forrajes.
- Conserve el producto en el envase, original, etiquetado y cerrado.
- Causa irritación moderada a los ojos y piel.
- Evite contacto con la piel y la ropa.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Spiroketamine.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión no inducir al vómito, tratar sintomáticamente
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- Nota al médico: tratamiento sintomático y de sostén. No hay antídoto específico.

Teléfono de emergencia: SAMU: 106.

ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Altamente Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o altamente permeables
- En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente dispuesto en un lugar seguro a fin d evitar su lixiviación hacia agua subterránea.

# CLEANTON®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Spiroxamine ..... 500 g/l  
Aditivos.....c.s.p 1 L

Registro PQUA N° 1293 - SENASA

Importador y Distribuidor:



Agro Klinge S.A.  
Av. El Derby N° 254, Int. 306. Santiago  
de Surco. Lima - Perú. Telf: (01) 641-0000

Formulador:

BETA CHEMICAL LTD.  
Rm. 707, Blk. A, Kingsound  
Center, No. 116 Zizhuyuan Road,  
Haidian District, Beijing, China

Titular del Registror:

ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.  
Av. EL Derby 254, Int 306. Santiago de Surco.  
Lima-Perú. Telf.: (01) 641-0000

Contenido Neto: 200 L

Fecha de Formulación:  
N° de Lote:  
Fecha de vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CLEANTON, es un fungicida a base de Spiroxamine usado para prevenir, curar y erradicar el ataque de Oidiosis en el cultivo de vid. Es un fungicida sistémico protectante, curativo y erradicativo. Es rápidamente absorbido por la planta, presentando traslocación acropétala. Inhibe la biosíntesis de esterol de los hongos.

CLEANTON se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, seguidamente se agita previo a la aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| Cultivo   | Plaga               |                                   | Dosis      |          | PC<br>(Días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|---------------------|-----------------------------------|------------|----------|--------------|--------------|
|           | Nombre<br>común     | Nombre<br>científico              | L/Ha       | ml/200 L |              |              |
| Vid       | Oidiosis            | <i>Erysiphe necator</i>           | 0.6        | -        | 28           | 1.0          |
| Alcachofa | Oidium              | <i>Leveillula taurica</i>         | 0.5 - 0.6  | -        | NA           | 0.05         |
| Espárrago | Mancha del<br>peral | <i>Stemphylium<br/>vesicarium</i> | 0.75 - 1.0 | -        | NA           | 0.05         |
| Páprika   | Oidium              | <i>Leveillula taurica</i>         | 0.5 - 0.6  | -        | NA           | 0.05         |

PC: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Residuos. N.A: No aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar una sola aplicación / campaña / año, como máximo, se puede aplicar durante cualquier etapa fenológica del cultivo de vid, respetando el periodo de carencia.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

CLEANTON, se puede mezclar con otros productos de uso agrícola, sin embargo se recomienda hacer pruebas de miscibilidad y fitocompatibilidad previas en pequeña escala.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en el cultivo recomendado

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.

09 cm