

AFALON[®] 50 PM

HERBICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición química:

Linuron 500 g/Kg

Aditivos c.s.p. 1 Kg

Reg N°: 148-96-AG-SENASA

Titular del Registro:



PROFIANDINA PERÚ S.A.

Calle Martir Olaya N° 169. Of. 705. Miraflores.
Lima - Perú. Telf.: (01) 255-7190.

Formulado por:
AGAN CHEMICAL
MANUFACTURERS LTD
Northern Industrial Zone
Ashdod 77102, Israel

Importado y Distribuido por:
PROFIANDINA PERÚ S.A.

Contenido neto :

Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forraje.
- Utilizar ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No desatorar las boquillas soplando con la boca.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Fenilureas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca manteniendo el párpado bien abierto por lo menos 15 minutos, acuda a un médico. Si el contacto fuese con la piel retírese la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, lavar la boca con abundante agua. Acuda a un médico. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación, llevar a la víctima al aire libre. En caso de presentarse problemas respiratorios brindar respiración artificial. Acuda a un médico.

NOTA AL MÉDICO: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)
CISPROQUIM: 080-050-847
CICOTOX : 0800-1-3040
INFOSALUD: 0800-10-828

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No utilizar este envase para conservar alimentos o agua potable.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame absorber el producto con arena u otro material inerte y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AFALON® 50PM es un herbicida selectivo, recomendado para el control de malezas anuales de hoja ancha y gramíneas, que se aplica en pre-emergencia o post-emergencia temprana del cultivo.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

AFALON® 50PM puede ser aplicado con toda clase de equipos pulverizadores terrestres de alto volumen. Utilizar boquillas de abanico plano. Mezclar la dosis recomendada de **AFALON® 50 PM** con un poco de agua hasta formar una pasta cremosa, sin grumos. Adicionar mas agua revolviendo continuamente y agregar este preparado al tanque de aplicación, el cual contiene el resto del agua, a través de una malla o cedazo. Durante la preparación de la mezcla y aspersión del producto mantener en marcha el sistema de agitación. Antes de iniciar la aplicación asegurarse que el equipo de pulverización se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado y que el terreno este limpio de rastrojos, bien mullido, firme y sin terrones.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Ver las observaciones del cuadro de usos para definir el momento y forma de aplicación.

PERIODO DE REINGRESO

Se podrá ingresar al campo sin ropa de protección después de 48 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

AFALON® 50PM es compatible con herbicidas a base de alaclor, atrazina, trifluralina, paraquat y glufosinato de amonio. Sin embargo se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad

FITOTOXICIDAD

AFALON® 50PM no es fitotóxico a los cultivos y dosis recomendados. No aplicar en presencia de viento fuerte.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de Usos

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS (kg/ha)		LMR (ppm)	OBSERVACIONES
	Nombre común	Nombre científico	Suelo liviano	Suelo pesado		
AJO	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	1.0	1.5	0.1	En pre-emergencia: Aplicar inmediatamente después de la siembra. En post-emergencia: Aplicar después que el cultivo tenga la segunda hoja desarrollada y una altura de 5 cm.
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>				
ANÍS	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>	1.0	2.0	0.1	En pre-emergencia: Aplicar inmediatamente después de la siembra En post-emergencia: Aplicar de forma dirigida sin tomar el cultivo y cuando la maleza no tenga mas de 4 hojas.
APIO	Capulí	<i>Nicandra physalodes</i>	0.5	1.0	0.2	Aplicar entre 10 y 15 días después del trasplante, cuando las malezas aun están tiernas, con no mas de 3 hojas.
CAÑA DE AZÚCAR	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>	5.0	6.0	0.2	En pre-emergencia: Aplicar inmediatamente después de un riego. En post-emergencia: Aplicar con malezas de nomas de 10 cm de altura.
CEBOLLA	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>	0.4	0.5	0.2	Aplicar después de transcurridos 8 -12 días del trasplante, apenas nacidas las malezas y repetir cuando sea necesario.
ESPÁRRAGO	Quinua	<i>Chenopodium album</i>	0.6	1.2	7.0	Aplicar en post-emergencia cuando las plantas de espárrago tenga entre 15 a 30 cm y las malezas de 1 a 2 hojas
MARIGOLD	Hierba gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>	0.6	1.2	0.2	Aplicar en post-emergencia temprana una vez que hayan prendido las plántulas de mangold entre 8 a 12 días después del trasplante.
PAPA	Nabo silvestre	<i>Brassica rapa spp. oleifera</i>	1.5	2.5	0.1	En pre-emergencia: Se puede aplicar desde la siembra hasta 12 días después. En post-emergencia: Aplicar de forma dirigida sin tocar la planta de papa y cuando las malezas no tengan mas de 4 hojas.
PIÑA	Rabo de zorro	<i>Setaria verticillata</i>	3.0	5.0	0.1	Aplicar de forma dirigida sin mojar las hojas del cultivo.
PORO	Hierba gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>	1.0	1.5	0.1	Aplicar entre 10-15 días del trasplante.
ZANAHORIA	Hierba mora	<i>Solanum nigrum</i>	1.5	2.0	0.2	Aplicar después del desarrollo de la tercera hoja verdadera
	Galinsoga	<i>Galinsoga parviflora</i>				

LMR : Límite Máximo de Residuos

*No se ha establecido periodo de carencia

