

10.7 cm



## PRECAUCION

Use equipo de protección adecuado. Se recomienda el uso de mascarilla o carilla, anteojos protectores, camisa manga larga y pantalón largo, guantes y botas de hule. No comer, beber ni fumar durante el manejo y aplicación de este producto. No mantener este producto en casa de habitación. No se almacene ni se transporte junto con productos alimenticios, ropa o forraje. Almacenar en un recipiente cerrado y a sobrio. Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Después de la aplicación, báñese y cámbiese de ropa.

En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y muéstrele una copia de esta etiqueta. Síntomas de intoxicación: cefalea, somnolencia, vértigo, sofocación, náuseas, vómitos e irritación de mucosas. Dar de beber un vaso de agua en sorbos, si puede tragar. No induzca el vómito. No dar de beber nada a un paciente inconsciente. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 a 20 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

Trátese sintomáticamente.

| CULTIVO   | ENFERMEDAD                        |                                              | DOSIS       |            | PC<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------------|
|           | NOMBRE<br>COMUN                   | NOMBRE<br>CIENTIFICO                         | L/cil. 200L | L/Ha       |              |                 |
| HOLANTAO  | "Oidium"                          | Erysiphe polygoni                            | 1 - 1.5     | --         | N.A.         | N.A.            |
| VID       | "Oidium"                          | Erysiphe necator                             | 1 - 1.5     | --         | N.A.         | N.A.            |
| MANGO     | "Oidium"                          | Oidium mangiferae                            | 1 - 1.5     | --         | N.A.         | N.A.            |
| PAPRIKA   | "Oidium"<br>"Podrición gris"      | Leveillula taurica<br>Botrytis cinerea       | 1 - 1.5     | --         | N.A.         | N.A.            |
| ESPARRAGO | "Mancha Púrpura"                  | Stemphylium vesicarium                       | 1 - 1.5     | --         | N.A.         | N.A.            |
| ALCACHOFA | "Podrición gris"<br>"Oidium"      | Botrytis cinerea<br>Leveillula taurica       | 1 - 1.5     | --         | N.A.         | N.A.            |
| CEBOLLA   | "Mildiu"                          | Peronospora destructor                       | 1 - 1.5     | --         | N.A.         | N.A.            |
| MANDARINO | "Podrición gris"                  | Botrytis cinerea                             | 1 - 1.5     | --         | N.A.         | N.A.            |
| FRESA     | "Podrición gris"                  | Botrytis cinerea                             | 1 - 1.2     | --         | N.A.         | N.A.            |
| TOMATE    | "Podrición gris"                  | Botrytis cinerea                             | 1 - 1.2     | --         | N.A.         | N.A.            |
| BANANO    | "Sigatoka negra"                  | Mycosphaerella fijiensis                     | 1.5 - 2     | --         | N.A.         | N.A.            |
| PALTO     | "Podrición gris"                  | Botrytis cinerea                             | 1.2 - 1.5   | --         | N.A.         | N.A.            |
| ARANDANOS | "Podrición gris"                  | Botrytis cinerea                             | 2           | --         | N.A.         | N.A.            |
| CAFÉ      | "Roya"                            | Hemileia vastatrix                           | 1.5         | --         | N.A.         | N.A.            |
| ARROZ     | "Añublo bacterlal de la panicula" | Burkholderia glumae                          | 1.5         | --         | N.A.         | N.A.            |
| QUINUA    | "Mildiu"                          | Peronospora farinosa                         | 1.5         | --         | N.A.         | N.A.            |
| VID       | "Podrición ácida"                 | Penicillium sp, Aspergillus sp, Rhizopus sp. | 1.5         | --         | N.A.         | N.A.            |
| PAPA      | "Rhizoctonia"                     | Rhizoctonia solani                           | 1.5         | 1.875      | N.A.         | N.A.            |
| LECHUGA   | "Fusarium"                        | Fusarium oxysporum                           | 1.5         | 1.8 - 2.25 | N.A.         | N.A.            |

L.M.R.=Límite máximo de residuos. Está exento de tolerancia de residuos en todos los cultivos agrícolas

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** se recomienda efectuar las aplicaciones de manera preventiva antes de que se presenten síntomas evidentes de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean favorables para la presencia del patógeno.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con todos los plaguicidas, fertilizantes foliares y bioestimulantes. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:** No se ha reportado fitotoxicidad cuando se usa siguiendo las recomendaciones de dosis y época de aplicación; sin embargo, se deben realizar pruebas de fitocompatibilidad en los cultivos recomendados ya que cada variedad puede reaccionar de manera diferente.

DL/50 Oral y Dermal aguda: > 5000 mg/kg

No hay un antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

"El Titular del registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las características físico-químicas indicadas en la etiqueta, y es eficaz para los fines que recomienda, siempre y cuando se sigan las instrucciones dadas".

F. de Formulación:

E de Vencimiento:

