

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No aspirar las gotitas de la aspersión durante la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forrajes.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Fenilpirazoles
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Lávese la boca con abundante agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente. Si la respiración es dificultosa, dar oxígeno. Si no hay respiración, realizar respiración artificial. Acuda a un médico.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco, mantener al paciente recostado y abrigado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con chorros de agua manteniendo el párpado bien abierto. Acuda a un médico.
- En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas, lavar la zona expuesta con jabón suave y agua; a continuación enjuague con agua tibia. Llame a un médico.
- NOTA AL MÉDICO: Se desconoce antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y terapia complementaria.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CISPROQUIM: 080-050-847; INFOSALUD: 0800-10-828
CICOTOX : 0800 - 13040 y (01) 328-7398

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para peces e invertebrados acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros
- El aplicador debe emplear todas las medidas para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

ALBATROSS® 200 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición química:

Fipronil 200 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 604 - SENASA



Formulado por:
PROFICOL ANDINA
B.V. SUCURSAL COLOMBIA
Calle 1 C N° 7-53
Interior Zona Franca
Barranquilla - Colombia

Importado y Distribuido por:
PROFIANDINA PERU S.A.

Contenido neto: 200 Litros

Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ALBATROSS 200 SC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión sobre el sistema nervioso central de los insectos impidiendo el paso de los iones cloruro a través del receptor de GABA. Tiene efecto residual y puede ser utilizado en rotación con insecticidas tradicionales para evitar la aparición de resistencia. Llenar el tanque del equipo a la mitad, preparar una pre-mezcla en un balde de agua e incorporarla al tanque de aplicación, luego adicionar agua hasta completar el volumen requerido y agitar hasta lograr una mezcla homogénea. Durante la preparación de la mezcla y aplicación del producto en campo mantener siempre en marcha el sistema de agitación. En caso de realizar mezclas en tanque con otros productos, ALBATROSS 200 SC deberá estar completamente disperso antes de la adición de otros materiales. Aplicar con cualquier equipo de pulverización terrestre. Utilizar mochila a motor en plantas grandes y frondosas para asegurar una buena cobertura y lograr que el producto llegue hasta donde se esconden y alimentan los trips (cebolla) o la mosquilla (tomate). Previo a la aplicación asegurarse que el equipo de pulverización se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado. Realizar la aplicación con gotas finas y cobertura uniforme. Esperar que el rocío se seque antes de aplicar, para no diluir el producto y disminuir la concentración aplicada.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
		L/200 L	L/ha		
ARROZ	Mosca minadora del arroz <i>Hydrellia wirthi</i>	-	0.20 - 0.30	46	0.01
CEBOLLA	Trips <i>Thrips tabaci</i>	0.20	-	N.D.	0.02
PAPA	Gorgojo de los Andes <i>Premnotypes suturicallus</i>	0.20	-	14	0.02
TOMATE	Mosquilla de los brotes <i>Prodidiplosis longifila</i>	-	0.3	N.D.	0.005

P.C.: Periodo de Carencia LMR : Limite Máximo de Residuos N.D. : No determinado

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Número máximo de aplicaciones por campaña-año: 2.
Intervalo mínimo entre aplicaciones: tomate: 5 días, cebolla: 7 días; arroz y papa : 10 días.
Momento de aplicación:
Arroz.- Iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros daños de la mosca minadora (aproximadamente 20% de tejido afectado)
Cebolla.- Realizar la aplicación con baja población de trips, máximo 10 individuos por planta.
Papa.- A partir de la emergencia de la planta se determinará el momento de aplicación, previa evaluación y según el umbral de daño económico.
Tomate.- Iniciar las aplicaciones cuando se observe 5% de plantas infestadas (máximo 1 larva por brote)

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común en agricultura a excepción de materiales fuertemente alcalinos. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad física.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Dimensiones: 320 x 200 mm