



¿QUÉ HACE?

Promueve en los cultivos sometidos a estrés (calor, sequía, toxicidad, baja luminosidad o baja temperatura), la rápida recuperación y el restablecimiento del metabolismo.

¿CÓMO LO HACE?

Los ácidos **ECCA Carboxy[®]** de esta formulación inducen la síntesis de polioles, que actúan como solutos compatibles para hidratar la célula y protectores enzimáticos, que en conjunto con la cantidad de fósforo que se incorpora a las moléculas energéticas de ATP reestablecen la actividad metabólica de la planta de manera rápida y prolongada.

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS			
pH: 2.5 - 3.5 a 25 °C		Forma: Líquido	Color: Café
Densidad: 1.20 a 1.40 g/cm³ a 25° C		No corrosivo. No inflamable.	
PROPIEDADES GENERALES			
Almacenamiento: Conservar cerrado en lugar fresco y seco.	Ambiental: No residual, de muy bajo impacto.	Incompatibilidad: Evitar agentes oxidantes fuertes.	Toxicidad: Ligeramente tóxico

INCOMPATIBILIDAD

No mezclar con productos que contengan Ca; sin embargo, siempre realice una prueba de incompatibilidad antes de mezclarlo.

DOSIS

CULTIVO	DOSIS (L/ha)	ÉPOCA Y NÚMERO DE APLICACIONES
Vid, palto, mango, cítricos, manzano, duraznero, peral	2 a 3	Realizar de 2 a 3 aplicaciones a intervalo quincenal, después de brotación
Berries (Arándano, cerezo)	1 a 2	Realizar de 2 a 3 aplicaciones según ciclo del cultivo
Olivo, café	1 a 2	Realizar de 1 a 2 aplicaciones según ciclo del cultivo
Apio, lechuga, col, tomate, ají, ajo, páprika, pimienta, frijol, espárrago, melón, alcachofa, papa, pepino, haba, sandía, zapallo, brócoli, coliflor, cebolla, arveja	1 a 2	2 a 3 aplicaciones: a intervalo quincenal después de siembra, trasplante, inicio de campaña y en producción.
Arroz, caña de azúcar, trigo, maíz	1 a 2	En mezcla con los herbicidas postemergentes y en punto de algodón.

Para desestresar realizar de 1 a 2 aplicaciones, inmediatamente después de la condición de estrés.

BENEFICIOS

- Disminuye pérdidas de rendimiento o calidad ocasionados por factores estresantes bióticos o abióticos.
- Recupera los cultivos después de un estrés por manejo.
- Restablece el vigor del cultivo después del trasplante o de periodos de aletargamiento.
- Previene y corrige desórdenes ocasionados por el deficiente metabolismo del carbono, ejemplo: fiebre de primavera.
- Disminuye la fitotoxicidad provocada por inadecuadas aplicaciones de agroquímicos.

RECOMENDACIONES DE USO

Se aplica por aspersión foliar, mezclado con suficiente agua para lograr una adecuada cobertura del follaje pudiendo ser mezclado con otros fertilizantes, haciendo una prueba previa de compatibilidad.

Para preparar la solución de aspersión con agua

- Agite el envase, desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad;
- Mida la cantidad a aplicar en recipiente graduado y vierta en cubeta para predilución o premezcla.
- Vierta el contenido de la cubeta en el tanque de la aspersora conteniendo la mitad del volumen de aspersión.
- Agite y complete el total del volumen de aspersión.

ESPECIFICACIONES

INGREDIENTE ACTIVO	g/L
Ácidos ECCA Carboxy [®]	39.0
Expresados como Carbono Orgánico Oxidable Total	234.0
Fósforo (P ₂ O ₅)	