

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Este producto es dañino no ingerir.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Peligroso si es inhalado.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.
- Causa daño irreversible a los ojos.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Evite el contacto con la piel y las mucosas. Puede causar irritación a los ojos.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Imidazolo
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar el paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos; si la irritación es grave, buscar asistencia médica. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No se ha determinado antídoto específico.
- Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
CICOTOX 0-800-1-3040  
POINT ANDINA S.A. (01) 348-1018

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.  
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.  
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

# impala®

## 50 CE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

#### Composición:

Imazalil .....500 g/L  
Aditivos .....c.s.p 1L

#### Registro PQUA N° xxx-SENASA

Titular de Registro: POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto Mz A6, Lote 15  
Urb. Santa Patricia II Etapa  
La Molina. Lima- Perú  
Tel: (01) 348-1018 / 349-9609

Formulado por:  
Point Agro-China Ltd

Wan Shi Town,  
Yixing, Jiangsu, 214217 China  
Tel. (86-510)8785 1001, Fax. 8785 1537

Importado y Distribuido por:  
Soluciones Técnicas Del Agro  
S.A.C.

Av. Guillermo Dansey 2176  
Lima Cercado - Perú  
Telf : (01) 3368645  
Fax : (01) 3368299

Softagro®

Soluciones Técnicas del Agro S.A.C.

Contenido Neto: 500 mL

N° Lote:  
Fecha de Form.:  
Fecha de Venc.:

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

IMPALA 50 CE es un moderno fungicida sistémico, efectivo para el control de hongos como Fusarium y Mildiu y para tratamiento post cosecha en frutos.

IMPALA 50 CE penetra muy fácilmente dentro de los tejidos de la planta permitiendo un control efectivo sobre los hongos.

IMPALA 50 CE se emplea también para la desinfección de semillas, camas de almacigo o campo definitivo.

IMPALA 50 CE debe aplicarse a los primeros síntomas de la enfermedad, la aplicación debe ser dirigida al pie de planta realizando una buena cobertura.

IMPALA 50 CE se emplea diluido en agua limpia. Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada del producto en un balde con agua; luego vaciar al tanque de aplicación, completar el volumen de agua a utilizar y agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

#### Cuadro de usos:

| CULTIVO   | ENFERMEDADES       |                              | DOSIS<br>ml / 200 L | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|           | Nombre común       | Nombre científico            |                     |              |              |
| Espárrago | Fusarium           | <i>Fusarium moniliforme</i>  | 200                 | Nd           | 0.05         |
| Te        | Fusarium           | <i>Fusarium oxysporum</i>    | 200                 | Nd           | 0.1          |
| Rosas     | Mildiu             | <i>Peronospora sparsa</i>    | 150 - 200           | NA           | NA           |
| Vid       | Hongo de la madera | <i>Botryosphaeria obtusa</i> | 200                 | 14           | 0.05         |

#### DESINFECCIÓN DE SEMILLAS:

|        |                  |                                 |                      |    |      |
|--------|------------------|---------------------------------|----------------------|----|------|
| Cebada | Fusarium         | <i>Fusarium graminearum</i>     | 2-4 ml/Kg de semilla | Nd | 0.05 |
|        | Helminthosporium | <i>Helminthosporium sativum</i> | 2-4 ml/Kg de semilla | Nd | 0.05 |

#### POST COSECHA:

|           |            |                              |             |    |   |
|-----------|------------|------------------------------|-------------|----|---|
| Mandarina | Moho verde | <i>Penicillium digitatum</i> | 0.4 - 0.6 % | Nd | 5 |
|-----------|------------|------------------------------|-------------|----|---|

LMR: Límite Máximo de Residuos. PC: Período de Carencia Nd: No disponible

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar al momento de siembra y al transplante del cultivo. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña y 2 campañas por año.

#### PERIODO DE REINGRESO

Se puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

#### COMPATIBILIDAD

IMPALA 50 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto los de reacción alcalina.

#### FITOTOXICIDAD

No se han reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos cuando es usado a las dosis recomendadas en esta etiqueta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

