# GOËMAR® CALIBRA

## FERTILIZANTE CE

## Mezcla de oligoelementos Manganeso (Mn) y Zinc (Zn) en forma de cloruros Filtrado de algas GA 142

**COMPOSICIÓN (P/P)**

| | |
|---|---|
| Total Manganeso (Mn) | 1% |
| 1% Manganeso soluble en agua | |
| Total Zinc (Zn) | 1% |
| 1% Zinc soluble en agua | |

**Contenido de Metales Pesados :**
Hg < 0.2 ppm, Cd < 2 ppm, As < 3 ppm, Pb < 10 ppm
**Solubilidad en agua a 20° C:** 100%
**pH:** 2.40 – 2.90
**Densidad a 20° C:** 1,060 – 1,075 g/cc

**Fabricado por:**
Laboratoires GOËMAR
Parc Technopolitain Atalante
CS41908
35435 Saint Malo Cedex - FRANCE
Tel : +33 2 99 19 19 19
Fax : +33 1 41 30 99 53

**Importado y distribuido por:**
Martinez y Valdivieso S.A.
Avenida Larraín 5862, piso 12, La Reina, Santiago
Chile

Ficha de seguridad disponible sobre demanda para los profesionales.

**INSTRUCCIONES PARA SU USO**
**SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA**
Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto a través de un filtro al tanque cuando este tenga tres cuartas partes de agua y a continuación llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante el tratamiento.

**Mezclas:**
Los productos GOËMAR pueden ser mezclados con la mayoría de los fitosanitarios de uso común en los momentos recomendados.

**Precauciones:**
Evitar las aplicaciones en condiciones climáticas extremas (condiciones de sequía, elevada humedad permanente, heladas, lluvia) o si se esperan inmediatamente. Usar guantes y mascarillas protectoras adecuadas cuando se manejan productos agroquímicos en general. Lávese todo el equipo de aplicación antes y después de su uso.

**ALMACENAMIENTO:**
Manténgalo en un almacén para productos químicos seco y fresco, fuera del alcance de los niños y animales, protegiéndolo de las heladas y demás condiciones climáticas adversas.

**Triple lavado de los envases:**
Vacíe el remanente de producto en el tanque de pulverizado y mantenga el envase en posición de descarga por un mínimo de 30 segundos. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase. Cierre el envase y agite durante 30 segundos. Vierta el agua en el equipo pulverizador. Mantenga verticalmente durante 30 segundos. Realice este procedimiento 3 veces. Perfore el envase para evitar su reutilización. Almacene los envases limpios, secos, sin tapa, en sitio cerrado y techado para entrega en centro de acopio autorizado.

**CONDICIONES DE VENTA - GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIONES DE LA RESPONSABILIDAD:**
GOËMAR garantiza que su producto cumple la descripción química de esta etiqueta antes de abrir el envase. Se debe seguir estrictamente las instrucciones de uso de esta etiqueta ya que están establecidas sobre la base de pruebas consideradas como confiables. Debido a que el uso mismo del producto o condiciones de clima o suelo inusual al momento del uso, están más allá del control del fabricante, no se otorga ningún tipo de garantía explícita o implícita en cuanto a los resultados obtenidos y bajo ningún concepto se podrá atribuir la responsabilidad al fabricante. El comprador asumirá todos los riesgos de almacenamiento, utilización o aplicación de este producto.

**5 LITROS**
**Contenido neto : 5,34 Kg**

UPL

CE CHL CAL5R- 0521 2635687 (0521)

# GOËMAR CALIBRA

| Especie | Dosis (L/Ha) | N° de aplicaciones | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Uva de Mesa sin semilla | 3 | 2 | Efectuar la primera aplicación una vez terminada la caída de bayas o "shatter" (bayas de 6 a 8 mm de diámetro). Repetir 7 a 10 días después. Puede aplicarse junto a los giberélicos de crecimiento. Mantener una concentración mínima de 200 cc/100 L de agua. |
| Uva de Mesa con semilla | 3 | 2 | Aplicar con bayas de 9 a 12 mm y repetir con bayas de 14 a 16 mm de diámetro. Puede aplicarse junto al ácido giberélico para crecimiento de bayas. Mantener una concentración mínima de 200 cc/100 L de agua. |
| Cerezos | 3 | 2 | Aplicar desde inicio de cuaja y repetir a los 7 a 10 días Mantener una concentración mínima de 200 cc/100 L de agua. |
| Kiwi | 3 | 2 | Primera aplicación 2 semanas después de plena flor y repetir a los 7 a 10 días después. Mantener una concentración mínima de 200 cc/100 L de agua. |
| Arándanos | 2 | 3 | Desde inicio de cuaja, y repetir cada 7-10 días. Mantener una concentración mínima de 200 cc/100 L de agua. |
| Damascos, Ciruelos, Duraznos, Nectarines | 3 | 2 | Aplicar desde inicio de cuaja y repetir a los 7 a 10 días. Mantener una concentración mínima de 200 cc/100 L de agua. |
| Pomáceas | 3 | 2 | Primera aplicación desde fruto recién cuajado, y repetir 7 a 10 días después. Mantener una concentración mínima de 200 cc/100 L de agua. |
| Nogales | 5 | 2 | Frutos recién cuajados, y repetir 15 días después |

**H412:** Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
**P273:** Evitar su liberación al medio ambiente.
**P501:** Eliminar el contenido/el recipiente en una planta autorizada

2635688 (0521)
CE CHL CAL5V- 0521