

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Bingo[®]

10% WP

PLAGUICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Polyoxin B 10%
Aditivos.....c.s.p. 100%

Reg. PBUA N° 306 - SENASA



Point
ENTREGAMOS
CALIDAD

Titular del registro: POINT ANDINA S.A.

Importado y distribuido por:

POINT ANDINA S.A.

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.

Santiago de Surco, Lima – Perú.

Teléfono +51 (01) 348-1018 / 349-9609

Formulado por:

JIXI AGROSINO BIOTECH CO., LTD.

Xuancheng City, Anhui Province,

255300, China

Contenido Neto: 100 g

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión accidental se puede proceder a inducir al vómito y consultar al médico.

NOTA AL MEDICO:

- No posee antídoto específico.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106;
POINT ANDINA S.A.: (01) 348 1018**

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contamine las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BINGO 10% WP es un fungicida biológico de amplio espectro de control, tiene acción de contacto y sistémica. **BINGO 10% WP** inhibe la síntesis de la quitina presente en la pared celular del hongo, evitando la germinación de las esporas, así como el crecimiento del tubo germinativo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones/campaña para alcachofa, pimiento y vid, con un intervalo mínimo de 15 días entre aplicaciones. Considerar 1 campaña/año, a excepción del pimiento que puede tener hasta 2. Aplicar cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO: No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los plaguicidas, con excepción de los que tienen reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/200 L	g/ha		
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	500	-	N.A	N.A
Vid	Oidiois	<i>Uncinula necator</i>	-	750 - 1000	N.A	N.A
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	-	750	N.A	N.A

P.C.: Período de Carenia. L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (partes por millón). N.A: No aplica

