



# Xquisito

## 50 CE

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

**Ingrediente activo:** Lambda-cyhalothrin 50 g/L

**Registro Senasa:** PQUA N.º 674 - SENASA

**Formulación:** Concentrado emulsionable (EC)

**Uso:** Insecticida de uso agrícola

**Formula química:** C<sub>23</sub>H<sub>19</sub>ClF<sub>3</sub>NO<sub>3</sub>

**Familia química:** Piretroides

**Grupo IRAC:** 3A

**Propiedades fisicoquímicas**

**Solubilidad:** 0.005 mg/L

**Presión de vapor:** 0.0002 mPa

**Coefficiente de Partición Octanol-Agua:** 5.5

### MODO DE ACCIÓN

**XQUISITO 50 CE** es un insecticida no sistémico que actúa por contacto e ingestión, actúa sobre el sistema nervioso de los insectos provocando hiperexcitación, convulsiones, parálisis y finalmente la muerte. Produce el bloqueo en la conducción de los estímulos nerviosos principalmente por modificar la permeabilidad de las membranas de las células nerviosas a los iones de sodio. Es muy activo en bajas dosis brindando resultados excelentes sobre una amplia gama de insectos, especialmente larvas de lepidópteros. También tiene actividad ovicida y adulticida.

### COMPATIBILIDAD

**XQUISITO 50 CE** debido a su especificidad se recomienda hacer una pre-mezcla previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del usuario.

### CATEGORIA TÓXICOLOGICA: MODERADAMENTE PELIGROSO.

LD<sub>50</sub>/oral/ratas (mg/Kg): = 163.5

LD<sub>50</sub>/dérmica/conejos (mg/Kg): = 1105.8

CL<sub>50</sub>/Inhalatoria (mg/L): 0.4 (4 horas de exposición continua)

Irritación en la piel: Causa leve irritación en la piel de los conejos.

Irritación ocular: Causa irritación moderada de los ojos en conejos.

Sensibilización: Sin datos.

### METODO DE EMPLEO

Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada en un balde con agua, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar de acuerdo al cultivo. Aplicar con cualquier equipo de aspersión, tratando de lograr una cobertura uniforme.

Fecha de actualización: marzo de 2022

Elaborado por el Área de Registros



## FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Se recomiendan 2 aplicaciones por campaña al año.

## RECOMENDACIONES BÁSICAS

Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos.

## PRESENTACIONES

Frasco de 250 mL  
Frasco de 500 mL  
Frasco de 1 L  
Cilindro de 200 L

## RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	ml/200L	ml/Ha		
Maíz	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	150	300*	7	0.02
Espárrago	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	-	250	3	0.02

PC.: Periodo de Carencia.

LMR.: Límite Máximo de Residuos.

\*En base a un volumen de 400 litros de agua.

Fecha de actualización: marzo de 2022

Elaborado por el Área de Registros