LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE:

- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.

PRIMEROS AUXILIOS:
AMPARO no es toxico por vía oral ni dermal, No posee antídoto.
DL50 del producto formulado:
Aguda oral > 2000 mg/Kg
Aguda dermal > 5000 mg/Kg

- Teléfonos de Emergencia: CICOTOX 0800-1-3040

CISPROQUIM 0800-50847 ; POINT ANDINA S.A. 3481018 / 349 9609

NOTA AL COMPRADOR:
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

Amparo® 0.3% SL

(Eugenol)

CONCENTRADO SOLUBLE-SL

Composición Química:
Eugenol……....…….....0.3%
Ingredientes inertes…….....99.7%

FUNGICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Registro PBUA N° 317 - SENASA

Titular del Registro:
POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto Mz A-6 Lote 15.
Urb. Santa Patricia II Etapa. La Molina. Lima - Perú
Telf.: (01) 348-1018

Fabricado y Formulado por:
Nantong Shenyu Green Medicine Co. Ltd.
East of Construction Road, Matang Town,
Nantong City, China.

Contenido Neto: **250 ml**
Fecha de Form:
Fecha de Venc:
N° de Lote:

INDICATIVOS DE USO Y MANEJO:

AMPARO tiene como ingrediente activo al Eugenol, ingrediente principal del aceite de clavo de olor.

AMPARO es un fungicida biológico de origen vegetal, que detiene el desarrollo del micelio en hojas y frutos aplicadas.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:
Para su adecuada aplicación, llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego aplicar el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	NOMBRE DE LA ENFERMEDAD		DOSIS L/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	Oidium	*Uncila necator*	0.3-0.5	-	-
Banano	Pudredumbre de la corona	*Gloesporium musarum*	0.3	-	-

LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm, PC: Periodo de Carencia en días.

Compatibilidad.- Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad previas antes de hacer mezclas en el tanque.

Fitotoxicidad.- No es fitotóxico a la dosis recomendada.

Manténgase alejado de las personas, animales, productos alimenticios y medicinas.

LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN

Destruya este envase inmediatamente después de usar el producto.