

FICHA TÉCNICA

Revisión: 3
Fecha Revisión: 11-03-2019

PRODUCTO:
ORGANICHEM® ZINC



- | | |
|-------------------------------|---|
| I. Nombre Comercial | : ORGANICHEM® ZINC |
| II. Ingrediente Activo | : Zinc, Materia Orgánica; ácidos Fúlvicos |
| III. Tipo | : No corresponde |
| IV. Concentración | : 13,5 % Zinc; 2,5 %Materia Orgánica; 0,26 % ácidos Fúlvicos (% p/v) |
| V. Formulación | : Líquido |
| VI. Modo de Acción | : Absorción foliar y radicular |
| VII. Proveedor | : CHEMIE® S.A. |
| VIII. Autorización SAG | : No Corresponde |
| IX. Características | : ORGANICHEM® ZINC es un fertilizante orgánico corrector de carencias de zinc en frutales, vides, hortalizas, y cultivos. Especialmente formulado para tratar todos los síntomas de su carencia en suelos ácidos y básicos tanto en pulverización foliar como aplicaciones directas al suelo. El Zinc es vital para la formación de clorofila y hormonas de crecimiento (auxinas), produciendo mayor desarrollo vegetativo y mayor rendimiento. |
| X. Compatibilidad | : Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios, pero se recomienda realizar pruebas de compatibilidad físicas de mezclas. Al mezclar ORGANICHEM® ZINC con productos fitosanitarios, debe ser incorporado como último componente de la mezcla. Las mezclas con fitosanitarios deben ser aplicadas inmediatamente después de su preparación y agitarse constantemente. |
| XI. Fitotoxicidad | : No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta |

FICHA TÉCNICA

Revisión: 3
Fecha Revisión: 11-03-2019

PRODUCTO:
ORGANICHEM® ZINC



XII. Aplicaciones

Cultivo	Dosis ml/hl	Momento de Aplicación y Observaciones
Limones, Naranjos, Mandarinos, Pomelos, Tangelos, Clementinas, Palto.	300-400	Aplicar en inicios de brotación de otoño y primavera.
Durazneros, Nectarinos, Cerezos, Ciruelos, Damascos, Avellano, Olivo.	300-400	Aplicar en yema hinchada y repetir en botón floral. Aplicar desde fruto cuajado cada 2 a 3 semanas hasta un mes antes de la cosecha. En Postcosecha aplicación antes de inicio senescencia de las hojas.
Almendros, Nogal	300-400	Aplicar a inicios de flor, repetir aplicación con brote de 15-18 cm. Aplicar dosis mayor en post cosecha a 30 días antes del inicio de caída de hojas.
Manzanos, Perales, Membrillos	300-400	Aplicar en apertura de yemas. No aplicar durante floración. A partir de 6 semanas después de caída de pétalos y repetir según necesidad en intervalos de 14 a 21 días hasta un mes antes de la cosecha. En postcosecha antes del inicio de caída de hojas.
Uvas de mesa, Uva vinífera.	300-400	Aplicar 20 días antes de inicio de flor y repetir a los 15 días.
Kiwis	300-400	Aplicar desde brote de 15 cm, cada 15 días
Arándanos, Frambuesas, Frutillas, Moras, Grosellas, Zarzaparrillas	300-400	Aplicar 1 a 2 veces preferentemente antes de floración.
Hortalizas: Lechugas, Endivias, Repollo, Apio, Achicoria, Brócoli, Coliflor, Zanahorias, Alcachofas, Pepinos, Melones, Sandías, Pimientos, Tomates, Ají	300-400	Estados temprano de crecimiento con cubrimiento adecuado.
Trigo, Avena, arroz (cereales)	300-400	Estados temprano de crecimiento con cubrimiento adecuado.
Papas	300-400	Aplicar una semana después de que ha emergido el 100% del cultivo. Con deficiencias moderadas repetir 10 a 14 días después
Cebollas, Ajos, flores bulbosas	300-400	Aplicar 30 y 60 días después del trasplante.
Maíz	300-400	Aplicar a partir de 3 a 8 hojas, repetir a inicios de panoja
Espárragos	300-400	Aplicar 15 días después de la apertura del meristema apical, repetir a los 20 días.
Remolacha	300-400	Aplicar desde 4 a 6 hojas.
Ornamentales	300-400	Aplicar a inicios de crecimientos de brotes.

XIII. Precauciones

: Debe protegerse de temperaturas extremas. Almacenamiento óptimo en un intervalo de 5 - 40 °C. Mantener el envase en lugar fresco y aireado.