

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Evitar el contacto con la piel y ropa.
- Causa daño temporal a los ojos.
- El contacto prolongado o repetitivo puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forraje.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Benzoylurea
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito. No administrar nada por vía oral a un paciente que se encuentre inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Nota al médico: No existe un antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- Teléfonos de emergencia : SAMU 106; ADAMA Agriculture Perú S.A. (01) 641-0000

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en época de desarrollo larval u otro estado temprano de los insectos que podrían presentarse en el área objetivo.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame absorber el producto con arena u otro material inerte y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Rimon®

10 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Novaluron 100 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° XXXX-SENASA

Titular del Registro,
Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of 306.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01) 641-0000

Formulado por:
ADAMA Makhteshim Ltd.
P.O. Box 60
Be'er Sheva 8410001, Israel.
Teléfono: (972) (8) 6296713

Contenido neto: **20 Litros**

Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Rimon 10 EC es un insecticida regulador del crecimiento del grupo de las benzoylurea, que actúa por ingestión sobre insectos inmaduros, principalmente estadios larvales 1 y 2, de lepidópteros inhibiendo la producción de quitina. No controla a los insectos adultos.

Rimon 10 EC se aplica por aspersión con cualquier equipo de pulverización terrestre, debiendo emplearse suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura de las plantas. Durante la preparación de la mezcla y aplicación del producto para mantener en marcha el sistema de agitación. Usar la dosis baja tan pronto se observen las primeras larvas y/o daños, usar la dosis alta cuando se tiene una presión alta de la plaga y/o las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de la plaga.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
Algodonero	Gusano perforador de la hoja	Bucculatrix thurberiella	-	0.25-0.30	28	0.5
	Gusano de la hoja	Anomis texana	-	0.1		
	Gusano de la hoja	Alabama argillacea	-	0.1		
	Gusano perforador grande de la bellota	Heliothis virescens	-	0.20-0.25		
Col	Gusano de la Col	Plutella xylostella	0.10 -0.15	-	14	0.7
Frijol	Gusano de los brotes	Epinotia aporema	0.10 -0.15	-	35	0.1
	Gusano medidor	Pseudoplusia includens	0.15	-		
Maíz	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.05 -0.10	-	35	0.01
Pimiento	Gusano perforador grande de la bellota	Heliothis virescens	-	0.20 -0.25	7	0.6
Tomate	Oruga minadora de la hoja y tallo	Scrobipalpa absoluta	0.10 -0.15	-	7	1

P.C.: Período de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar Rimon 10 EC hasta dos aplicaciones por campaña como máximo, considerando un intervalo entre aplicaciones de 10 días. Realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar el momento de aplicación, la cual debe ser realizada preferiblemente sobre larvas en estadios 1 y 2.

PERIODO DE REINGRESO

Se podrá ingresar al campo sin ropa de protección después de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

Se puede aplicar en mezcla con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común, sin embargo se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Dimensiones: 330 mm x 200 mm