BRALIC® 1.8 ME

EXTRACTO VEGETAL

INSECTICIDA AGRÍCOLA

MICROEMULSIÓN (ME)

COMPOSICIÓN:
Aceite esencial de ajo ..... 17.92 g/L
(equivalente a 6.27 g/L Allyl disulfide)
Aditivos..... csp 1L

Reg. PBA-EV N° XXX-SENASA

Titular del Registro,
Importador y Distribuidor
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of 306.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01)641-0000

Formulador:
Ingeniería Industrial S.A de CV
Carretera Tecualtitlan km 0.676, colonia,
San miguel de Zapotitlan, Poncitlan
Jalisco, CP 45977. México.

ADAMA

PRECAUCIÓN

1

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DEL PRODUCTO FORMULADO
Apariencia: líquido viscoso, amarillo traslúcido.
Densidad: 1.0226 g/ml **pH**: 5 - 6
Estabilidad en almacenamiento:

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Evite el contacto con el producto y la formación de vapores/aerosoles .
- Conservar el producto en un lugar sombreado, fresco y seco, bajo llave en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer o beber durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

CLASE Y CAPACIDAD DEL ENVASE
Botellas 250 ml, 500 ml, 1 L, Galoneras de 5 L, garrafa de 20 L y cilindro 200 L.

2

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de inhalación, lleve a la persona al aire fresco. Si la respiración es deficiente brinde respiración artificial. Procure atención médica si fuese dificultoso.
- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consiga atención médica.
- En caso de contacto con la piel, lave con abundate agua y jabón. Si la irritación persiste acuda a atención médica.
- En caso de ingestión no inducir el vómito ni administre nada a una persona inconsciente. Si es necesario consiga atención médica.
- No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106
ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641-0000.

3

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua.
- No tiene efecto negativo sobre la fauna benéfica y/o silvestre.
- No contaminar con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes de productos o envases vacíos.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MODO DE ACCIÓN Y MECANISMO DE ACCIÓN
BRALIC 1.8 ME es un insecticida biológico basado en extracto de ajo. El cual posee acción disuasora en los hábitos alimenticios de insectos y plaga y obstruye la acción de las feromonas naturales causando desorientación a los insectos en su etapa de reproducción. Compuesto principalmente por diversos sulfuros de dialilo, utilizado como disuasivo para insectos.

4

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
El producto se emplea mediante aspersión foliar con pulverizadoras terrestres de uso corriente, boquilla cono abierto.
Modo de preparación: llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de **BRALIC 1.8 ME** , luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante.
Se recomienda antes de iniciar la aplicación verificar que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado. La aplicación debe asegurar una buena cobertura del follaje y frutos sin llegar al escurrimiento .

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
- Se recomienda aplicar BRALIC 1.8 ME hasta dos (02) aplicaciones por campaña, considerando una (01) campaña por año para arándano y vid. Asimismo, considerar un intervalo mínimo entre aplicaciones de 7 días.
- Aplicar cuando se presenten los primeros síntomas o cuando las condiciones climáticas favorezcan el incremento de la enfermedad.
- Realizar las aplicaciones del BRALIC 1.8 ME desde etapa de floración - cuajado hasta maduración de la baya, ya que es la etapa más susceptible al ingreso de la plaga al racimo.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha		
ARÁNDANO	"Chanchito blanco"	*Planococcus citri*	2.0	N.A.	N.A.
VID					

P.C: Período de carencia L.M.R: Límite máximo de residuos NA: No aplica

5

PERIODO DE REINGRESO
No aplica por ser un producto biológico.

COMPATIBILIDAD
Incompatibles con materiales alcalinos fuertes, materiales ácidos fuertes y oxidante fuerte.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones."

6

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE SENASA

Dimensiones: 300 mm x 105 mm