

LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir ni inhalar la aspersión.
- Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Evitar el contacto con la piel y ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas se debe utilizar para conservar alimentos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No desatorar las boquillas soplando con la boca.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Benzilfenil urea + Piretroide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta y hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito, ni administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.
- En caso de contacto con los ojos mantenga el párpado abierto, lavar los ojos con abundante agua durante 15 a 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, llevar a la víctima al aire libre. En caso de presentarse problemas respiratorios, brindar respiración artificial. Acuda a un médico.
- NOTA AL MÉDICO: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)

CISPROQUIM: 080-050-847; CICOTOX: 0800-1-3040; INFOSALUD: 0800-10-828

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



ADAMA

Rimon® Duo

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN

Novaluron 50 g/L
Bifenthrin 50 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PGUA N° 1600-SENASA

Titular del Registro: ADAMA Agriculture Perú S.A.

Formulado por:

ADAMA Makhteshim Ltd.
P.O. Box 60,
Be'er Sheva 8410001. Israel.

Importado y Distribuido por:

ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of. 503.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01) 641-0000

Contenido neto: 500 ml

Lote No.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Rimon Duo es un plaguicida de acción combinada (contacto + ingestión) que suma la acción de los insecticidas piretroides y benzil ureas, logrando un control inmediato y prolongado efecto residual. Su uso está recomendado especialmente para el control de larvas fitófagas y adultos de insectos masticadores.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
		(L/200L)	(L/Ha)		
Pimiento	Gusano perforador del fruto (<i>Heliothis virescens</i>)	-	0.75 - 1.0	7	0.5 ¹ / 0.7 ²
Frijol	Gusano medidor (<i>Chrysodeixis includens</i>)	0.2	-	14	0.3 ¹ / 0.1 ²

PC: Período de Carenia

LMR: Límite Máximo de Residuos (en partes por millón). ¹Bifenthrin / ²Novaluron

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVO	N° Aplic/ campana	Campanas/ año	Intervalo entre aplicaciones
PIMENTO	1	1 - 2	-
FRIJOL	2	2	10 días

Momento de aplicación

Pimiento: Se recomienda utilizar la dosis mas baja tan pronto se observen las primeras larvas y/o daños causado por las larvas de *Heliothis virescens*, en campos infestados hasta con 20% de plantas infestadas.

Frijol: Se recomienda iniciar las aplicaciones cuando la evaluación registra una larva por planta o se observen los primeros daños.

PERIODO DE REINGRESO

Se podrá ingresar al campo sin ropa de protección después de 24 horas de aplicado el producto.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con sustancias de fuerte reacción alcalina. En caso de mezclas con otros productos, se recomienda bajo responsabilidad del usuario, realizar evaluaciones previas a pequeña escala, con el fin de determinar la compatibilidad física y fitocompatibilidad de la mezcla a usar.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Dimensiones : 230 mm x 120 mm

Esta etiqueta requiere Hoja Informativa