

Tamaño: 27 x 15 cms 07.11.22

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

BC-1000® Líquido es un producto de muy baja toxicidad, no corrosivo, no volátil, no explosivo, no irritante, inodoro, estable a la luz y a temperaturas de hasta 40°C.

Sin embargo, se recomienda lo siguiente:

- Protéjase los ojos al momento de aplicarlo.
- No comer, beber o fumar durante el uso del producto.
- Durante la aplicación usar equipo de protección como botas, guantes, pechera, protector facial, que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo.
- Se recomienda guardar el producto en su envase original, en un lugar seco, fresco y exclusivo para productos fitosanitarios.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Los síntomas de intoxicación son dolor de cabeza y malestar general.

Si el contacto es por vía dérmica: Se debe remover la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón neutro la zona afectada, incluyendo pelo y uñas.

Si el contacto es por vía ocular: Quitar lentes de contacto, ya sean ópticos o de contacto y luego mantener los párpados abiertos para lavar con abundante agua por al menos 15 minutos.

Si el contacto es por vía oral: No inducir vómito, en primera instancia dirigirse al Servicio de Salud más cercano o consultar a un centro de Información Toxicológica.

Si el contacto es por inhalación: trasladar al paciente al aire libre, lejos del área contaminada y dejar en reposo, conseguir atención médica y si se hace dificultosa la respiración dar oxígeno y ventilación.

NOTA AL MEDICO:

No inducir vómito, administrar carbón activado (o medicina), diluidos en 4 partes de agua tibia hasta obtener consistencia de sopa espesa.

ANTIDOTO:

No tiene antídoto específico.

TELÉFONO DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

CHEMIE AGROVETERINARIA: 511- 7141788

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No vierta **BC-1000® Líquido** puro directamente a pozos, riachuelos, ríos o lagos.
- **BC-1000® Líquido** es un producto natural de baja toxicidad a organismos acuáticos, aves y abejas.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

BC-1000® Líquido

(ÁCIDO ASCÓRBICO, BIOFLAVONOIDES, CÍTRICOS, ÁCIDO CÍTRICO, PEPSINA CÍTRICA Y AZÚCARES)

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE – (EC)

Composición:

Cada 100 mL de **BC1000® Líquido** contiene:

Biomasa cítrica 50 % por peso

La cual contiene:

Ácido ascórbico (Vit C) min 2,50 % por peso

Bioflavonoides cítricos (Vit. P) 0,50 - 2,00 % por peso

Ácido cítrico, pepsina cítrica

y azúcares 0,80 - 1,20 % por peso

Residuos vegetales cítricos 44,30 - 46,20 % por peso

Vehículo inerte 50 % por peso

Reg. PBUA N° 060-SENASA.

Titular del Registro: CHEMIE AGROVETERINARIA® S.A.C.



Formulado por: CHEMIE AGROVETERINARIA® S.A.C.,

Car. Panamericana Sur Km. 17.4, Mza. C lote 3

Urb. La Concordia, Villa El Salvador,

Lima - Perú, Fono (51 1) 3720456

Distribuidor: CHEMIE AGROVETERINARIA® S.A.C.

Av. Tomas Ramsey N° 930 Of. 905, Magdalena del Mar

Teléfono: 511 - 7141788

Lima - Perú

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Fecha de Vencimiento:

CONTENIDO NETO: ☐ 1 L ☐ 5 L ☐ 20 L ☐ 200 L

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Fungicida natural de contacto con un excelente control preventivo y curativo sobre *Botrytis*, *Penicillium*, *Fusarium*, *Erwinia*, Oídio y algunos hongos y bacterias en post cosecha en vides, frutales, hortalizas y plantas ornamentales. Especialmente indicado para el control de *Botrytis*.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para usar adecuadamente **BC-1000® Líquido** se recomienda agregar agua al estanque de aplicación hasta aproximadamente la mitad de sus capacidad y luego incorporar la dosis recomendada de **BC-1000® Líquido** finalmente llenar el estanque. Es necesario realizar esta maniobra con agitación constante.

APLICACIÓN:

La aplicación se efectúa mediante aspersor, pulverizador o nebulizador, directamente sobre el área deseada. El producto está especialmente indicado para ser utilizado en el control y eliminación de los microorganismo indicados a continuación:

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis mL/100 L de agua	P.C	*L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico			
Vid	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	150 - 220	N.A	N.A
Páprika	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	170 - 220	N.A	N.A
Tomate	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	170 - 220	N.A	N.A
Alcachofa	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	150 - 180	N.A	N.A
Holantao	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	150 - 220	N.A	N.A
Banano	Podredumbre de la corona	Complejo fungoso <i>Lasiodiplodia theobromae</i> <i>Macrophoma</i> sp <i>Thielaviopsis paradoxa</i>	300 - 500	N.A	N.A
Mango pre-cosecha	Sigatoka negra	<i>Mycosphaerella fijiensis</i>	200 - 400 mL/ha		
Post-cosecha	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	150 - 200 mL/100 L de agua. Aplicar 35 y 25 días antes de la cosecha. 75 - 100 mL + 100 L de cera vegetal (inmersión o aspersión)	N.A	N.A
Arándano	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1,5 - 2,0 L/ha	N.A	N.A
Palto (post cosecha)	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	250 mL/100 L	N.A	N.A

Cultivo	Plaga		Dosis L/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico			
Vid	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	Aplicaciones preventivas: 1,5 - 1,8 L/ha Aplicaciones curativas: 2,0 - 2,3 L/ha	N.A	N.A
	Podredumbre ácida	(<i>Aspergillus</i> spp., <i>Alternaria</i> spp., <i>Cladosporium</i> spp., <i>Penicillium</i> spp., <i>Rhizopus</i> spp.)	Aplicaciones preventivas: 1,8 a 2,3 L/ha Aplicaciones curativas: 2,3 a 2,5 L/ha	N.A	N.A

P.C. = Período de Carenia *L.M.R. = Límite Máximo de Residuos N/A = No aplica

NOTA: Para el control de Sigatoka negra en bananos se recomienda aplicar con un volumen de agua de 350 L/ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Nota: Para el control de Sigatoka negra en bananos se recomienda aplicar con un volumen de agua de 350 L/ha.

Para el control de *Botrytis* en parrones y viñas, hacer la aplicación solo hasta floración pues puede causar manchas al fruto por aplicación defectuosa.

Por ser un producto orgánico natural, puede ser usado en pre-cosecha y cosechas sin problemas de residuo en programas preventivos.

Para control de *Botrytis* realizar las aplicaciones cada vez que existan condiciones propicias a la enfermedad (aplicaciones preventivas).

Para control de *Botrytis* en tratamiento de postcosecha debe aplicarse las dosis recomendadas **BC-1000® Líquido** de mediante aspersor o inmersión a través de tinajas, estanques con ducha, etc.

Para el control de Sigatoka Negra se debe mezclar **BC-1000® Líquido** con aceite agrícola y se recomienda hacer aplicaciones con un intervalo de 10 días, utilizando la dosis más alta en épocas de alta precipitación.

Para control de arándanos realizar aplicación preventiva cuando hayan condiciones climáticas favorables para el desarrollo de la enfermedad o se observe indicios de su presencia.

Para control de arándanos en post cosecha se recomienda usar la dosis mayor en condiciones propicias para el patógeno (zonas lluviosas, con alta humedad relativa (mayor de 90%) y temperatura de 15 a 20°C).

La cantidad de agua a utilizar en la aspersión de **BC-1000® Líquido**, no debe ser menor de 750 litros/ha.

Se recomienda realizar por lo menos tres aplicaciones, en los estados fenológicos de floración a fructificación. El período de tiempo entre las aplicaciones debe ser de 7 a 10 días, dependiendo principalmente de las condiciones de clima favorable para *B. cinerea*.

Para el control en paprika, tomate, alcachofa, holantao realizar de 2-3 aplicaciones por campaña.

Para el control de mango pre-cosecha realizar dos aplicaciones a los 32 y 25 días antes de la cosecha y para post cosecha realizar la aplicación en inmersión.

PERÍODO DE REINGRESO: Reingresar al área aplicada después de las doce (12) horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Se recomienda realizar previamente pruebas de aplicación de campo.

FITOTOXICIDAD: No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

