

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta o esta hoja informativa.
- En caso de contacto con los ojos mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con agua por 15 a 20 minutos, remover los lentes de contacto si los hubiera. Si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no inducir al vómito, beber y enjuagar la boca con abundante agua. No administrar nada a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y enjuagar la piel con abundante agua por 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar ventilado. Si la persona tiene dificultad para respirar, dar respiración artificial.

SÍNTOMAS

No hay síntomas específicos resultantes conocidos de la sobreexposición aguda, que se produzcan en los seres humanos. Los estudios en animales han demostrado que este material es de baja toxicidad por las vías oral y dérmica. No es irritante para la conjuntiva ocular, y no es irritante cutáneo.

En caso de emergencias llamar a:

TELEFONOS DE EMERGENCIA: POINT ANDINA S.A.: (01) 348 1018

SAMU: 106; CISPROQUIM: 080-050-847

Antídoto : No hay antídoto específico

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contamine las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto: polvo amorfo claro

Color: blanquecino

Olor: ligero olor como a hongo

pH: 6.5 (1% de susp. acuosa)

Densidad aparente: 260 g/L

Corrosividad: No corrosivo

Explosividad: No explosivo

Inflamabilidad: No inflamable

Presentaciones comerciales:

5g

50g

100g

250g

Formulado por:

BIOPREPÁRÁTY, spol. S R.O.,

Tylišovská 772/1, 160 00 Praha 6,

Czech Republic



AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Pythium oligandrum (Mínimo 1 millón de oosporas/g) Min. 100 g/Kg

Aditivos c.s.p. 1Kg

Reg. N° 090-SENASA-PBA-ACBM

Titular de Registro, Importado y

Distribuido por:

POINT ANDINA S.A.

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.

Santiago de Surco, Lima – Perú.

Teléfono +51 (01) 348 1018



Point
ENTREGAMOS
CALIDAD

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



PRECAUCIÓN

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

EL DORADO® POLYVERSUM es un fungicida biológico con acción de contacto para el control de un amplio espectro de patógenos.

EL DORADO® POLYVERSUM coloniza el ecosistema de la planta a través de 3 mecanismos de acción:

micoparásita al patógeno, induce resistencia de la planta mediante la producción de oligandrina y estimula su crecimiento mediante la producción de triptamina.

Para su aplicación, agitar el sobre y mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total.

Aplicar con mochila mecánica o a motor.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN

Para preparar la mezcla, utilizar guantes y botas de goma, delantal, tapabocas y careta de protección. Durante la aplicación, utilizar guantes y botas de goma, overol, máscara, gafas y gorro.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Para su aplicación, mezclar las dosis recomendadas en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con mochila mecánica o a motor.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda 2 aplicaciones por campaña/año, considerando una campaña al año, aplicar cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad en los cultivos de arándano, vid y fresa. Para el cultivo pimiento, se recomienda 2 aplicaciones por campaña/año, considerando 10 días entre aplicaciones, a pH 6.5 - 7. Para el cultivo de alcachofa, se recomienda 2 aplicaciones por campaña/año, considerando 10 - 15 días entre aplicaciones, a pH 6.5 - 7.

Para el cultivo de palto, se recomienda 2 aplicaciones/campaña en la etapa de floración, considerando 1 campaña/año y un intervalo de 15 días entre aplicaciones. El gasto de agua es de 1000 - 1200 L/ha, con un valor pH 7. En el caso del cultivo de granado, se recomienda 2 aplicaciones/campaña considerando 1 campaña/año y un intervalo de 15 días entre aplicaciones, a pH 6.5 - 7.0.

PERIODO DE REINGRESO: No ingrese a las áreas tratadas durante una hora después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los plaguicidas, con excepción de los que tienen reacción alcalina. No mezclar con fungicidas.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a la dosis recomendada.

EFFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS

No tiene efecto sobre otros cultivos.

EFFECTOS SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS Y/O SUSCEPTIBLES

No se han reportado efectos sobre otros cultivos ni susceptibilidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	Kg/200L		
Arándano	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3 - 0.4	-	N.A.	N.A.
Vid	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.06 - 0.08	N.A.	N.A.
Fresa	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.1	-	N.A.	N.A.
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.25 - 0.3	-	N.A.	N.A.
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.25 - 0.3	-	N.A.	N.A.
Palto	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3 - 0.4*	-	N.A.	N.A.
Granado	Alternaria	<i>Alternaria alternata</i>	0.4	-	N.A.	N.A.

P.C.: Período de Carenía. | N.A.: No Aplica | L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (partes por millón). | *Gasto de agua:1000 - 1200 L/ha

