

ADAMA

Rimon® Duo

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN

Novaluron50 g/L

Bifenthrin50 g/L

Aditivos c.s.p.1 Litro

Reg. PQUA N° 1600 - SENASA

Titular de Registro:

ADAMA Agriculture Perú S.A.

Av. El Derby N° 254 Of. 306.

Santiago de Surco. Lima - Perú.

Teléfono: (01) 641-0000

Formulado por:

ADAMA Makhteshim Ltd.

P.O. Box 60

Be'er Sheva 8410001, Israel.

Importado y Distribuido por:

AGRO KLINGE S.A.

Av. El Derby N° 254 Of. 306.

Santiago de Surco. Lima - Perú.

Contenido neto: 5 Litros

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO

DAÑINO

Cara

Dimensiones: 150 mm x 140 mm
Esta etiqueta requiere Hoja Informativa

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir ni inhalar la aspersión.
- Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Evitar el contacto con la piel y ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas se debe utilizar para conservar alimentos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No desatorar las boquillas soplando con la boca.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Benzotifenil urea + Piretroide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela copia de esta etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito, ni administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.
- En caso de contacto con los ojos mantenga el párpado abierto, lavar los ojos con abundante agua durante 15 a 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, llevar a la víctima al aire libre. En caso de presentarse problemas respiratorios, brindar respiración artificial. Acuda a un médico.
- NOTA AL MÉDICO: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106; ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopia autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Rimon Duo es un insecticida de acción combinada (contacto + ingestión) que brinda control inmediato y prolongado de larvas fitófagas y adultos de insectos masticadores.

Rimon Duo se aplica en aspersión directa al follaje con equipo de pulverización terrestre. Esperar que el rocío se seque antes de aplicar y mantener en marcha el sistema de agitación durante la aplicación.

Consulte con ingeniero agrónomo

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	(L/Cil)	(L/Ha)		
Arándano	Gusano perforador del fruto	<i>Heliothis virescens</i>	0.3	-	7	1.8' / 7 ²
Brócoli	Gusano de la col	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.3	-	7	0.4' / 0.7 ²
Frijol	Gusano medidor	<i>Chrysodeixis includens</i>	0.2	-	14	0.3' / 0.1 ²
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.3	-	100	0.05' / 0.05 ²
Palto	Gusano del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	0.2	-	30	0.5' / 0.6 ²
Pimiento	Gusano perforador del fruto	<i>Heliothis virescens</i>	-	0.75 - 1.0	7	0.5' / 0.7 ²
	Polilla	<i>Symmetrischema capsicum</i>	-	0.75 - 1.5		

PC.: Período de Carenia

LMR : Límite Máximo de Residuos (en partes por millón). 1-Bifenthrin / 2-Novaluron

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar hasta dos (02) aplicaciones por campaña con un intervalo de 10 días. Considerar una (01) campaña al año en los cultivos de arándanos, paltos y pimientos, y dos (02) en brócoli, frijol y maíz.

Momento de aplicación

Ver la hoja informativa.

PERIODO DE REINGRESO, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Ver la hoja informativa adjunta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Contracara