

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

HOOK®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Buprofezin..... 250 g/kg
Aditivos..... csp 1 kg

Reg. PQUA N° 2268-SENASA

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante la operación de la mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Tiadiazinas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la Hoja Informativa.
- En caso de ingestión, no administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Inducir al vómito bajo asistencia de un médico.
- En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si la molestia continua consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar inmediatamente las partes afectadas con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación llevar al paciente a un lugar ventilado, aplicar respiración artificial de ser necesario. Consulte con un médico.

Nota al médico: No posee antídoto, el tratamiento es sintomático.
Teléfono de emergencia: SAMU:106, Agro Klinge S.A.: (01) 641 0000

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para artrópodos benéficos. Evitar su aplicación en época de desarrollo larval.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro, a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: HOOK es un insecticida inhibidor de síntesis de quitina, que actúa por contacto e ingestión, con buen efecto residual. Controla eficazmente los estados inmaduros (ninfas) de insectos como mosca blanca, queresas y otros. Además, produce una elevada infertilidad en los adultos tratados. Respeta los insectos benéficos, por lo que se recomienda para programas de Manejo Integrado de Plagas.

HOOK Se aplica en pulverizaciones en mezcla con agua. Aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre, utilizando la suficiente cantidad de agua para cubrir uniformemente el follaje.

VOLUMEN DE APLICACIÓN: Cultivos bajos: 400 a 600 L/ha- Frutales: 1,000 a 2,000 L/ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar HOOK (i.a. Buprofezin) hasta 02 aplicaciones por campaña como máximo y con una frecuencia entre aplicaciones de 14 a 21 días. Realizar las aplicaciones cuando se observe la presencia de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos y dosis recomendadas

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.”

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	kg/200 L		
NARANJO	"Mosca blanca"	<i>Aleurothrixus floccosus</i>	0.5	0.1	14	1
MANDARINA	"Queresa redonda"	<i>Selenaspilus articulatus</i>	1.0	0.2	14	1
OLIVO	"Queresa blanca móvil"	<i>Orthezia olivicola</i>	1.0	0.2	14	5
TOMATE	"Mosca blanca"	<i>Bemisia tabaci</i>	0.5	0.15	1	1
PIMIENTO	"Mosca blanca"	<i>Bemisia tabaci</i>	0.2		3	2
VID	"Cochinilla harinosa"	<i>Planococcus ficus</i>	--	0.2	31	0.02
PALTO	"Queresa del palto"	<i>Fiorinia florinae</i>	--	0.2 - 0.25	23	0.1
	"Escama latania"	<i>Hemiberlesia lataniae</i>	--			

P.C.= Período de carencia / L.M.R.= Límite máximo de residuos

Contenido neto:
25 kg

N° Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Titular del Registro, Importador
y Distribuidor:



Agro Klinge S.A.
Av. El Derby 254. Int. 306. Santiago de Surco.
Lima-Perú. Telf.: (01) 641-0000

Formulado por:
Ningbo Generic
Chemical Co., Ltd.
Room 10-6, Shidai Square, N° 8,
Lengjing Street, Ningbo 315010,
Zhejiang, China.

® Marca Registrada

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



UI:270219 V2