BULLSEYE® 72 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Sal de dimetilamina 2,4-D ..... 720 g/L

Aditivos .....c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2726 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.
Av. Javier Prado Este N° 6728 Int. 301-A
Urb. Santa Patricia II Etapa
La Molina, Lima, Perú
Teléfono: (01) 499-7831

Formulado por:
POINT AGRO - CHINA LTD.
Wan Shi Town,Yixing, Jiangsu 214217. China

Contenido Neto : 4 L
Lote Nº :
Fecha de formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa daño temporal a los ojos.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Alkylchlorophenoxy
- En caso de contacto cutáneo, retirar la ropa y calzado contaminado. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón, durante 15 minutos.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia por lo menos durante 30 minutos, cuidando que los párpados estén bien abiertos.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Mantener al afectado tranquilo y en un lugar protegido de la luz. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.
- En caso de inhalación, transportar a la persona al aire fresco y mantenerla en reposo. Si la respiración se dificulta, ofrecer respiración artificial. Consiga atención médica si persiste la dificultad respiratoria.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Antídoto: No se dispone de antídoto específico tratamiento de soporte.

Teléfonos de Emergencia:
CICOTOX: (01) 328 7700; ESSALUD: (01) 4118000 opción 4;
INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS: (01) 499-7831

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contamine ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos del producto.
- No contamine las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro, a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BULLSEYE 72 SL es un herbicida hormonal selectivo post emergente, para el control de la mayoría de malezas de hoja ancha. Al ser aplicado sobre las malezas se transloca hacia las partes apicales (de crecimiento continuo) activando de manera descontrolada el desarrollo de la planta con su consiguiente muerte. Los síntomas por lo general son hipertrofia y deformación de la planta.

Llenar el tanque con agua hasta la mitad, luego diluya la dosis indicada y complete con agua hasta alcanzar el volumen total, agite y proceda a aplicar. La aplicación se puede hacer con cualquier equipo de aspersión, manual o mecánico y con boquilla para herbicidas de buena cobertura, tratando de hacer una aplicación uniforme. Hacer las aplicaciones por las mañanas (poco viento) para evitar la contaminación de cultivos vecinos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		Dosis (L/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Maíz	"Chamico"	*Datura stramonium*	0.75-1	7	0.05
	"Capuli cimarrón"	*Nicandra physaloides*	0.75-1	7	0.05
	"Verdolaga"	*Portulaca oleracea*	0.75-1	7	0.05
Caña de azúcar	"Chamico"	*Datura stramonium*	2	42	0.05
	"Hierba del Gallinazo"	*Chenopodium murale*	2	42	0.05
	"Yuyo"	*Amaranthus hibridus*	2	42	0.05
	"Lechera"	*Euphorbia hirta*	2	42	0.05
	"Verdolaga"	*Portulaca oleracea*	2	42	0.05
	"Capuli cimarrón"	*Nicandra physaloides*	2	42	0.05
	"Alfalfilla"	*Melilotus indicus*	2	42	0.05
Trigo	"Cardo santo"	*Argemone mexicana*	0.75 -1	14	0.5
	"Mostaza"	*Brassica campestris*	0.75 -1	14	0.5

PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda una (1) aplicación por campaña como máximo, considerando 2 campañas al año para el cultivo de maíz y 1 campaña por año para el cultivo de caña de azúcar y trigo.

Se recomienda aplicar después de la siembra en las primeras etapas de las malezas.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar hasta después de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD: Por su especificidad sobre el control de malezas de hoja ancha se recomienda aplicar solo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas en la etiqueta. Es fitotóxico al algodón, tomate, beterraga y árboles frutales.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.