

Longitud Total 28.9 cm.

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El producto es nocivo por ingestión.
- No deberá ser empleado en ambientes cerrados como invernaderos, almacenes, bodegas, etc.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto es irritante para los ojos, la piel y el aparato respiratorio.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- El producto es incompatible con sustancias oxidantes (agua oxigenada, lejía, etc.) puede causar fuego.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Piretroide.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Su ingestión produce síntomas de intoxicación como náuseas, vómitos, mareos o desmayos, contracciones. No induzca el vómito, ni dé de beber líquidos.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

Nota al médico: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.**Teléfono de emergencia:** SAMU: 106; ADAMA Agriculture Perú S.A.: (01) 641-0000**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y viértala solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de No aplicación de 5 metros hacia fuentes de agua.
- Peligroso para las abejas. Nocivo para la fauna benéfica. No aplicar en épocas de floración de cultivo.
- Toxico para ganado y peligroso para animales domésticos y fauna silvestre.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA****INSECTICIDA AGRÍCOLA****CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)****COMPOSICIÓN:**

Alpha- cypermethrin.....	100 g/L
Ciclohexanona.....	815 g/L
Aditivos.....	85 g/L

Reg. PQUA N° 340-SENASA

Titular del Registro:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254, Int. 306.
Santiago de Surco.Lima - Perú.
Telf: (01) 641-0000

Importador y Distribuidor:

AgroKlinge
A member of ADAMA
AGRO KLINGE S.A.
Av. El Derby N° 254, Int. 306. Santiago
de Surco.Lima - Perú. Telf: (01) 641-0000

Formulado por:
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.
6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Center,
Shunhua Road 750#, Jinan, Shandong,
China. Telf: +86-531-88875230

Contenido Neto: 1 Litro

Lote N° :
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

**INFLAMABLE****NO CORROSIVO****NO EXPLOSIVO****MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: ALFAKLING® 10 EC es un insecticida piretroide de segunda generación, que actúa por contacto e ingestión en forma inmediata y con buen poder residual.

SISTEMA Y FORMA DE APLICACIÓN: ALFAKLING® 10 EC es empleado en pulverizaciones en mezcla con agua. Las aplicaciones pueden hacerse con cualquier equipo de aspersión terrestre o aérea, en forma uniforme, procurando cubrir todo el follaje.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C.	L.M.R.
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/ha	ml/200L	(días)	(ppm)
PAPA	(*) "Mosca minadora" "Polilla"	Liriomyza huidobrensis	400-500	200-250	15	0,05
		Phthorimaea operculella	300-400	150-200		
ALGODONERO	"Gusano rosado de la India"	Pectinophora gossypiella	-----	150-200	N.D.	0,05
TOMATE	"Polilla"	Tuta absoluta	-----	200-300	3	0,1
ESPÁRRAGO	"Trips"	Thrips tabaci	-----	100-150	14	0,1
PÁPRIKA	"Polilla del fruto"	Symmetrischema capsicum	-----	150-200	14	0,05
VID	"Trips"	Frankliniella williamsi	-----	100-150	14	0,5

(*) Sólo adultos / P.C. = Período de carencia / L.M.R.= Límite máximo de residuos**VOLUMEN DE APLICACIÓN:** 400 L/ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar la aplicación de ALFAKLING® 10 EC cuando se observa la presencia de la plaga a controlar. **Se considera suficiente una sola aplicación por campaña para controlar la plaga registrada.**

PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 48 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: ALFAKLING® 10 EC es incompatible con productos de reacción alcalina, tales como azufre, cal y productos a base de cobre.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto".

UI/0601 2020 V2

Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.

09 cm