

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Use equipo de protección adecuado.
Se recomienda el uso de mascarilla o carilla, anteojos protectores, camisa manga larga y pantalón largo, guantes y botas de hule.
No comer, beber ni fumar durante el manejo y aplicación de este producto.
No mantener este producto en casa de habitación.
No se almacene ni se transporte junto con productos alimenticios, ropa o forraje.
Almacenar en lugar fresco, seco y a la sombra.
Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Después de la aplicación, báñese y cámbiese de ropa.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y muéstrela una copia de esta etiqueta.
Síntomas de intoxicación: cefalea, somnolencia, vértigo, sofocación, náuseas, vómitos e irritación de mucosas.
Dar de beber un vaso de agua en sorbos, si puede tragar. No induzca el vómito. No dar de beber nada a un paciente inconsciente.
En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 a 20 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

Trátase sintomáticamente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CISPROQUIM: 0800-50847 SAMU: 106 Bayer S.A: 01-2113800

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Bacillus amyloliquefaciens, (Cepa QST 713) 1.34%
Aditivos,c.s.p 100%

* Contiene un mínimo de 1 x10⁸ CFU/g

Registro PBUA N° 090-SENASA

Titular del Registro:

Bayer S.A.
Calle Amador Merino Reyna N. 223
Interior 802, Urb. Jardín.
San Isidro, Lima - Perú.
Telf. 2113800

Formulado por:

Bayer de México, S.A de C.V
Autopista San Martín Texmelucan Tlaxcala
Km 6.5, Col. San Felipe Ixtacuixtla
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros,
Tlaxcala C.P. 90120, México.

Importado y distribuido por:

Bayer S.A.
Calle Amador Merino Reyna N. 223
Interior 802, Urb. Jardín.
San Isidro, Lima - Perú.
Telf. 2113800

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO
NO INFLAMABLE

Contenido Neto: 4 Litros

Lote N°:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

® = Marca Registrada del grupo Bayer

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SERENADE ASO es un biofungicida que protege los cultivos contra enfermedades fúngicas y bacteriales. **SERENADE ASO** contiene la cepa patentada QST 713 de la bacteria *Bacillus amyloliquefaciens*, que brinda una acción antimicrobiana superior comparado con cepas comunes de *B. subtilis*.

SERENADE ASO actúa creando inicialmente una zona de inhibición en la hoja, previniendo la instalación del patógeno y destruyendo finalmente el tubo germinativo y micelio del patógeno.

SERENADE ASO se aplica en pulverizaciones previa mezcla con agua, utilizando equipos de aspersión terrestres. Para su preparación verter la dosis recomendada en la mitad del total de agua a utilizar, agitar bien y completar el resto de agua. En el cultivo de arándano, la aplicación en post cosecha es en pulverización en la línea de packing y utilizando un equipo de aplicación de gotas muy finas para evitar el manchado de la fruta.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS			PC (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/cil. 200L	%	L/ha		
HOLANTAO	"Oidium"	Erysiphe polygoni	1 - 1.5	--	--	N.A.	N.A.
VID	"Oidium"	Erysiphe necator	1 - 1.5	--	--	N.A.	N.A.
MANGO	"Oidium"	Oidium mangiferae	1 - 1.5	--	--	N.A.	N.A.
PAPRIKA	"Oidium"	Leveillula taurica	1 - 1.5	--	--	N.A.	N.A.
ESPARRAGO	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	1 - 1.5	--	--	N.A.	N.A.
ALCACHOFA	"Mancha Púrpura"	Stemphylium vesicarium	1 - 1.5	--	--	N.A.	N.A.
CEBOLLA	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	1 - 1.5	--	--	N.A.	N.A.
MANDARINO	"Podrición gris"	Leveillula taurica	1 - 1.5	--	--	N.A.	N.A.
FRESA	"Podrición gris"	Peronospora destructor	1 - 1.5	--	--	N.A.	N.A.
TOMATE	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	1 - 1.5	--	--	N.A.	N.A.
BANANO	"Sigatoka negra"	Botrytis cinerea	1.5 - 2	--	--	N.A.	N.A.
PALTO	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	1.2 - 1.5	--	--	N.A.	N.A.
ARANDANOS	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	0.5 - 1.5	--	2 - 6	N.A.	N.A.
CAFÉ	"Roya"	Hemileia vastatrix	1.5	--	--	N.A.	N.A.
ARROZ	"Añubio bacterial de la panícula"	Burkholderia glumae	1.5	--	--	N.A.	N.A.
QUINUA	"Mildiu"	Peronospora farinosa	1.5	--	--	N.A.	N.A.
VID	"Podrición ácida"	Penicillium sp., Rhizopus sp., Aspergillus sp.	1.5	--	--	N.A.	N.A.
PAPA	"Rhizoctonia"	Rhizoctonia solani	1.5	--	1.875	N.A.	N.A.
LECHUGA	"Fusarium"	Fusarium oxysporum	1.5	--	1.8 - 2.25	N.A.	N.A.
ARANDANOS	"Podrición gris"	Botrytis cinerea en post cosecha	--	7.5	--	N.A.	N.A.

N.A = No aplica, PC= Período de carencia (días), LMR= Límite Máximo de Residuos (Exento de tolerancia de residuos en todos los cultivos agrícolas)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: se recomienda efectuar las aplicaciones de manera preventiva antes de que se presenten síntomas evidentes de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean favorables para la presencia del patógeno.

PERÍODO DE REINGRESO: 12 horas.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con todos los plaguicidas, fertilizantes foliares y bioestimulantes. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No se ha reportado fitotoxicidad cuando se usa siguiendo las recomendaciones de dosis y época de aplicación; sin embargo, se deben realizar pruebas de fitocompatibilidad en los cultivos recomendados ya que cada variedad puede reaccionar de manera diferente.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las características físico-químicas indicadas en la etiqueta, y es eficaz para los fines que recomienda, siempre y cuando se sigan las instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."



PRECAUCION

