

"LA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

No debe transportarse ni almacenarse conjuntamente con productos alimenticios, bebidas, forrajes, medicinas, entre otros. No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Después de terminada la aplicación lavarse todas las partes del cuerpo con abundante agua y jabón y cambiarse de ropa. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Manténgase en envases originales, almacenándolo herméticamente en lugares frescos y secos alejado del alcance de los niños y animales.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Fluprocicarb (carbamato), Flupiciclotide (Acy) Picalcide) En caso de intoxicación llame al médico o lleve al paciente al médico y muéstrela esta etiqueta. Mantenga al paciente en una zona ventilada y en posición de descanso. De soporte respiratorio si es necesario. No induzca al vómito.

Indicaciones para el médico
Tratamiento sintomático y de soporte. Mantenga libres las vías respiratorias y si es necesario por medio de respiración controlada.

Antídoto

Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CISPROQUIM: 0800-50847 SAMU: 106

Bayer S.A. 01-2113800

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido del envase, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuernos de agua de al menos 5 metros. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



FUNGICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Propanocarb HCl, 625 g/L
Flupiciclotide, 62.5 g/L
Aditivos, cap 11

Reg. POLA N. 259-SENASA

Título del Registro:

Bayer S.A.
Calle Amador Moreno Reyna N. 223
Interior 502, Urb. Jardín,
San Isidro, Lima - Perú.

San Isidro, Lima - Perú.

Formulado por:

Bayer SAS
1 Avenue Edouard Herriot
BP 442
69568 Villefranche-sur-Saône Cedex
France

Importado y distribuido por:

Bayer S.A.
Calle Amador Moreno Reyna N. 223
Interior 502, Urb. Jardín,
San Isidro, Lima - Perú.
Telf. 2113800

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

Contenido

Neto: 1 Litro

Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
NI de lote:

® = Marca Registrada del grupo Bayer



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Infinito 688 SC es un fungicida formado por dos ingredientes activos complementarios: Flupiciclotide y Propanocarb. Flupiciclotide tiene actividad antisporangia y un buen potencial curativo específico contra hongos del género *Uromyces*. Propanocarb interfiere en el metabolismo del hongo actuando como antisporangia e inhibe la síntesis de fitoplasmas y ácidos grasos. Infinito 688 SC es un fungicida preventivo y curativo con acción translaminar y un novedoso modo de acción: detiene el movimiento de las zoosporas y las destruye en solo unos segundos convirtiéndose como un producto eficaz en el control de *Phytophthora infestans* en el cultivo de papa.

Agite el producto antes de utilizarlo. Se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Llenar el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad. En recipiente aparte mezclar el producto en agua hasta formar una mezcla homogénea, verter la mezcla al tanque del equipo y complete el volumen de agua a utilizar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		LMR (ppm) (días)	PC
	Nombre común	Nombre técnico	%	ml/cil. / l/ha		
Papa	Re Mancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.3-0.4	600-900	1.5-2	0.5 (1)
Quinua	Mildu	<i>Peronospora farinosa</i>	--	500	--	0.1 (1)
						0.01 (2)
						80

PC = Período de curación LMR = Límite máximo de residuos

(1) LMR Propanocarb (2) LMR Flupiciclotide

* Emplear la dosis en porcentaje (%) o mililitros cuando se use pulverizadora manual, para aplicaciones en avión, tractor o mochila aplicar en dosis en la proporción indicada en el gráfico de agua por ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar al inicio de síntomas de la enfermedad. Se recomienda realizar dos aplicaciones por campaña dentro de un programa de manejo integrado.

PERIODO DE REINGRESO: A las 12 horas.

COMPATIBILIDAD:

Compatible con productos comúnmente usados en agricultura, sin embargo, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala antes de aplicar. No mezcle con productos alcalinos.

FITOTOXICIDAD:

Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados siguiendo las indicaciones y dosis establecidas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físicas/químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."