

MOHICANO®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Fipronil 200 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° 364 - SENASA

Grupo Químico: Fenilpirazoles


Nombre Químico:

(+/-)-5-amino-1-2-(2,6-dichloro- α,α,α -trifluoro-paratolyl)- 4-trifluorometh-

ylsulfenyl-pyrazole-3-carbonitril

Formula Empírica: C₁₂H₆ClF₃N₄OS

Peso Molecular: 437.15 g/mol



NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Líquido

Color: Blanco

Olor: Sin olor característico

pH: 5 - 8

Densidad: 1.06 g/ml

Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo

Corrosividad: No corrosivo

Estabilidad: Estable por 2 años manteniendolo en su empaque original a temperatura ambiente.

PRESENTACIONES COMERCIALES:

200ml, 500ml, 1L, 200 L

Titular de Registro, Importado y

Distribuido por

POINT ANDINA S.A.

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.

Santiago de Surco, Lima – Perú.

Teléfono: (01) 348 1018

Formulado por:

POINT AGRO-CHINA LIMITED

Wan Shi Town, Yixing,

Jiangsu, 214217 China



INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

• Grupo químico: Fenilpirazoles

• En caso de presentar los síntomas de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

• Nota al médico: lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

• En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. Si hay contacto con la piel, quitarse las ropas contaminadas y lavarse con abundante agua y jabón.

• No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente

TELEFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106;

POINT ANDINA S.A. (01) 348 1018

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

• Peligroso para las abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.

• Peligroso para organismos acuáticos.

• No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

• No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

• Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

• Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.

• El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

• En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

• Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

• Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

• Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

• No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

• No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.

• Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

• Después de usar este producto bañarse con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.

• Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

• Almacenar el producto en un lugar sombreado, seco y ventilado en su envase original bien cerrado.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MOHICANO es un insecticida que pertenece al grupo de los Fenil-Pirazoles, afecta principalmente el sistema nervioso central de los insectos bloqueando el canal GABAregulador del cloro, actúa por contacto e ingestión.

MOHICANO se emplea diluido en agua; preparar un pre-mezcla con la dosis recomendada en un balde, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

MOHICANO puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras o pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor). Iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo del cultivo.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN:

Para preparar la mezcla, utilizar guantes y botas de goma, delantal, tapabocas y careta de protección. Durante la aplicación, utilizar guantes y botas de goma, overol, máscara o respirador, gafas y gorro.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Puede variar de acuerdo a la incidencia del insecto, también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y la época de siembra.

Número máximo de aplicaciones por campaña: 2.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

EFFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS

No tiene efecto sobre otros cultivos.

EFFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS Y/O SUSCEPTIBLES

No se han reportado efectos sobre otros cultivos ni susceptibilidad

COMPATIBILIDAD:

MOHICANO es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS ml/Cil	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	200	21	0.005
Arróz	Gusano rojo	<i>Chironomus xanthus</i>	150	51	0.01
Tomate	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	250	21	0.005
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	150-250	21	0.005
Brócoli	Polilla de la brócoli	<i>Plutella xylostella</i>	125	7	0.02
Papa	Gorgojo de los andes	<i>Premnotypes suturicallus</i>	250-250	14	0.02

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos expresados en ppm

