

ADAMA

# Afalon®

## 50 PM

HERBICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Linuron ..... 500 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p.1Kg

Reg. N° 148-96-AG-SENASA

Titular del Registro: **ADAMA Agriculture Perú S.A.**

Importado y Distribuido por:  
**ADAMA Agriculture Perú S.A.**  
Av. Alfredo Benavides N° 1555 Of 404.  
Miraflores. Lima - Perú.  
Teléfono: 641-0000

Formulado por:  
**ADAMA Agan Ltd**  
P.O. Box 262,  
Ashdod 7710201. Israel.

CONTENIDO NETO: **1 Kilogramo**

Lote No.  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

Cara

Dimensiones 210 mm x 150 mm

### LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
  - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
  - No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forraje.
  - Utilizar ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
  - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
  - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
  - Evitar el contacto con la piel y los ojos.
  - No desatarar las boquillas con la boca.
- PRIMEROS AUXILIOS:**
- Grupo Químico: Fenilureas.
  - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
  - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca manteniendo el párpado bien abierto por lo menos 15 minutos, acuda a un médico. Si el contacto fuese con la piel retirese la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
  - En caso de ingestión, lavar la boca con abundante agua. Acuda a un médico. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
  - En caso de inhalación, llevar a la víctima al aire libre. En caso de presentarse problemas respiratorios brindar respiración artificial. Acuda a un médico.
  - Nota al médico: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria. Acuda a un médico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)  
CISPROQUIM: 080-050-847; INFOSALUD: 0800-10-828  
CICOTOX: 0800-13040

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
  - No utilizar este envase para conservar alimentos o agua potable.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
- Peligroso para organismos acuáticos; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
  - En caso de derrame absorber el producto con arena u otro material inerte y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
  - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**Afalon 50 PM** es un herbicida selectivo, recomendado para el control de malezas anuales de hoja ancha y gramíneas que se aplica en pre-emergencia o post-emergencia temprana del cultivo.

**Sistema de preparación y aplicación:**

**Afalon 50 PM** puede ser aplicado con toda clase de equipos pulverizadores terrestres de alto volumen. Utilizar boquillas de abanico plano. Mezclar la dosis recomendada de **Afalon 50 PM** con un poco de agua hasta formar una pasta cremosa, sin grumos. Adicionar mas agua revolviendo continuamente y agregar este preparado al tanque de aplicación, el cual contiene el resto del agua, a través de una malla o cedazo. Durante la preparación de la mezcla y aspersión del producto mantener en marcha el sistema de agitación.

Antes de iniciar la aplicación asegurarse que el equipo de pulverización se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado y que el terreno este limpio de rastros, bien mullido, firme y sin terrones.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Ver las observaciones del cuadro de usos para definir el momento y forma de aplicación.

**PERIODO DE REINGRESO**

Se podrá ingresar al campo sin ropa de protección después de 48 horas de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

**Afalon 50PM** es compatible con herbicidas a base de alaclor, atrazina, trifluralina, paraquat y glufosinato de amonio. Sin embargo se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad

**FITOTOXICIDAD**

**Afalon 50PM** no es fitotóxico a los cultivos y dosis recomendados. No aplicar en presencia de viento fuerte.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de Usos**

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS (kg/ha)		LMR (ppm)	OBSERVACIONES
	Nombre común	Nombre científico	Suelo liviano	Suelo pesado		
AJO	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	1.0	1.5	0.1	En pre-emergencia: Aplicar inmediatamente después de la siembra. En post-emergencia: Aplicar después que el cultivo tenga la segunda hoja desarrollada y una altura de 5 cm.
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>				
ANÍS	Amar seco	<i>Bidens pilosa</i>	1.0	2.0	0.1	En pre-emergencia: Aplicar inmediatamente después de la siembra. En post-emergencia: Aplicar de forma dirigida sin tocar el cultivo y cuando la maleza no tenga mas de 4 hojas.
APIO	Capulí	<i>Nicandra physalodes</i>	0.5	1.0	0.2	Aplicar entre 10 y 15 días después del trasplante, cuando las malezas aun están tiernas, con no más de 3 hojas.
CAÑA DE AZÚCAR	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>	5.0	6.0	0.2	En pre-emergencia: Aplicar inmediatamente después de un riego.
CEBOLLA	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>	0.4	0.5	0.2	Aplicar después de transcurridos 8 -12 días del trasplante, apenas nacidas las malezas y repetir cuando sea necesario.
ESPÁRRAGO	Quinoa	<i>Chenopodium album</i>	0.6	1.2	7.0	Aplicar en post-emergencia cuando las plantas de espárrago tengan entre 15 a 30 cm y las malezas de 1
MARIGOLD	Hierba gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>	0.6	1.2	0.2	Aplicar en post-emergencia temprana una vez que hayan prendido las plántulas de marigold entre 8
PAPA	Nabo silvestre	<i>Brassica rapa spp. oleifera</i>	1.5	2.5	0.1	En pre-emergencia: Se puede aplicar desde la siembra hasta 12 días después. En post-emergencia: Aplicar de forma dirigida sin tocar la planta de papa y cuando las malezas no
PIÑA	Rabo de zorro	<i>Setaria verticillata</i>	3.0	5.0	0.1	Aplicar de forma dirigida sin mojar las hojas del cultivo.
PORO	Hierba gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>	1.0	1.5	0.1	Aplicar entre 10-15 días del trasplante.
ZANAHORIA	Hierba mara	<i>Salanum nigrum</i>	1.5	2.0	0.2	Aplicar después del desarrollo de la tercera hoja verdadera.
	Galinsoga	<i>Galinsoga parviflora</i>				

LMR : Límite Máximo de Residuos

\*No se ha establecido periodo de carencia



Contracara