

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Chloroacetanilide.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado, bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **Antídoto:** No existe antídoto específico. El tratamiento es netamente sintomático.
- **Teléfono de emergencia:** CICOTOX: 0800-13040 (gratuito), ESSALUD: 0801-10200, (línea gratuita), AGRO KLINGE: (01) 6126565

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades
- locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

® Marca Registrada

EXOCET RICE®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Butachlor..... 600 g/L

Aditivos csp 1L

Reg. PQUA N° XXX-SENASA

Titular del Registro y Distribuidor:



AGRO KLINGE S.A.

Calle René Descartes N° 311,

Urb. Santa Raquel 2^{da} Etapa, Ate. Lima-Perú.

Telf.: 612-6565 / R.U.C N° 20508704217

Formulado por:

Tecnología Química y Comercio S.A.

Calle René Descartes N° 311,

Urb. Santa Raquel 2^{da} Etapa, Ate. Lima - Perú

Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020

R.U.C N° 20307150981

Lote N°:

F. de Formulación:

F. de Vencimiento:

Contenido

Neto: 4 L

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: EXOCET RICE es un herbicida sistémico, selectivo que controla, principalmente en pre-emergencia, malezas gramíneas, cyperáceas anuales y algunas malezas de hoja ancha, según el cuadro de uso.

- Aplicar **EXOCET RICE** utilizando el envase aplicador, directamente sobre la poza de arroz con una lámina de agua de 5 a 10 cm. Para una buena eficacia del herbicida, mantener el agua de la poza retenida y sin circulación por 2 a 3 días. Posteriormente, continuar con la práctica de riego normal. Las aplicaciones deben hacerse en pre-emergencia y, en casos extremos, cuando las malezas tengan no más de 2 hojas verdaderas.
- Verter el producto en el envase aplicador y utilizarlo directamente sobre la poza. Abanicar el envase aplicador, asperjando el producto de izquierda a derecha, tratando de alcanzar 3 a 4 metros de distancia por vez, repetir la operación en forma continua, hasta terminar la dosis recomendada.

Nota: Para la presentación de 500 ml utilizar el mismo envase como aplicador.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

Cultivo	Malezas		Dosis	P.C. Días	L.M.R (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arroz	“Yuyo”	<i>Amaranthus spinosus</i>	3 - 4 L/ha	N.A.	0.1
	“Moco de pavo”	<i>Echinochloa crusgalli</i>			
	“Pajilla”	<i>Leptochloa uninervia</i>			
	“Cadillo”	<i>Cenchrus echinatus</i>			
	“Pata de gallina”	<i>Eleusine indica</i>			
	“Coquito”	<i>Cyperus esculentus</i>			
	“Lechera”	<i>Euphorbia hirta</i>			
	“Verdolaga”	<i>Portulaca oleracea</i>			

P.C.=Período de carencia / L.M.R.=Límite máximo de residuos/ N.A.=No aplicable, por no dejar residuos en la cosecha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar una aplicación al inicio de la campaña.

PERIODO DE REINGRESO: 48 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: A la dosis recomendada no es fitotóxico en el cultivo de arroz.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos de reacción alcalina.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

Producto Peruano

