



ESPECIFICACIONES DE AGROINSUMOS			
TIPO DE AGROINSUMO: Fertilizante orgánico			
NOMBRE COMERCIAL: PILATUS®			
FORMULACIÓN: Líquido	pH DE LA FORMULACIÓN: 2 a 3.5 (al 10%)	COLOR: Café	SOLUBILIDAD EN AGUA: Miscible
COMPOSICIÓN PORCENTUAL: % EN PESO Materia orgánica total (origen vegetal)..... 30.10 Acido fúlvico..... 3.01 Aminoácidos totales..... 1.97 Inositol..... 0.42 Zinc (Zn)..... 4.92 Inertes y diluyentes..... 64.98 Total..... 100.00		PRINCIPALES COMPUESTOS DE LA FORMULACIÓN: Extractos Vegetales, Ácido Fúlvico, Sulfato de Zinc, Aminoácidos y Vitamina.	
		FAMILIA QUIMICA: Diversas, complejo orgánico.	
		FORMULA QUIMICA: Compleja.	
MODO DE ACCIÓN: PILATUS® es una fórmula desarrollada primordialmente para proveer de nutrientes y estimular el crecimiento de raíces y pelos absorbentes en cultivos de siembra directa o de trasplantes de plantas provenientes de almácigos o invernaderos, logrando un crecimiento más rápido y vigoroso y un mejor establecimiento en campo.			
CATEGORÍA DE PELIGRO: No aplica	RESIDUALIDAD: No es Residual.	NÚMERO DE REGISTRO: RSCO-039/VII/05	
USOS AUTORIZADOS: PILATUS® es un producto para aplicaciones edáficas en el riego por goteo o dirigidas al pié de cada planta disuelto en suficiente cantidad de agua para lograr una buena distribución en la superficie a aplicar. Puede mezclarse con los fertilizantes líquidos y aplicarlos conjuntamente al suelo.			
Cultivos	Dosis Litros/ha/aplicación	Época de aplicación	
Calabaza, melón, pepino y sandía	1 a 2	1ra. En el primer riego después de emergencia. 2da. 15 días después del primero. 3ra. 15 días después del segundo.	
Cebolla	1 a 2	1ra. En el primer riego después de emergencia. 2da. 15 días después del primero.	
Cítricos	2 a 3	1ra. En el primer riego después de la plantación. 2da. 30 días después del primero. 3ra. Primer riego post-brotaciones.	
Chiles, pimientos, tomate (jitomate)	0.5 a 2	1ra. En el primer riego después del trasplante. 2da. 15 días después del primero. 3ra. 15 días después del segundo.	
Flores: rosales, clavel	2 a 3	1ra. En el primer riego después de la siembra. 2da. 30 días después del primero. 3ra. Aplique después de los picos de producción.	
Fresa	1 a 2	1ra. En el primer riego después del trasplante. 2da. 15 días después del primero.	
Papa	1 a 2	1ra. Asperje al momento de la siembra.	
Uva de mesa	2 a 3	1ra. En el primer riego después de la plantación. 2da. 30 días después del primero. 3ra. Primer riego post-brotaciones.	
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS: Lea detenidamente la etiqueta del producto y siga las indicaciones de uso.	PRESENTACIONES COMERCIALES: Envase de 1 L Garrafa 20 L 200 L	RESPONSABLE DEL PRODUCTO: Arysta LifeScience México, S.A. de C.V. Blvd. Jesús Valdés Sánchez No. 2369 Col. Europa, C.P. 25290. Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México. Tel. 01 844 438 05 00.	