

ETIQUETA: 24 X 18 CM
Abril 2023
AG

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

KOPASSUS®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Pyraclostrobin	130 g/kg
Boscalid	250 g/kg
Aditivos.....	c.s.p.1 kg

Reg. PQUA N° 2629 - SENASA

Titular del registro:
MONTANA S.A.

**Formulado por: ZHEJIANG UDRAGON
PESTICIDES AND CHEMICALS CO., LTD.**
Tangxi Industry Area, Hangzhou, Zhejiang,
China.

Importado y distribuido por: MONTANA S.A.
Av. Javier Prado 6210 Oficina 401.
La Molina, Lima-Perú
Teléfono: (511) 419-3000
e-mail: info@corpmontana.com

Contenido Neto: 1 kg.

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

 **MONTANA**

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes secos, frescos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Strobilurin (Pyraclostrobin), Carboxamide (Boscalid).
 Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
 En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
 Si es ingerido: No inducir al vómito. No administrar nada por la vía oral si la persona está inconsciente. Si está consciente dar de beber leche o gelatina si estos están disponibles, caso contrario grandes cantidades de agua.
 En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado. Eliminar lavando con jabón y abundante agua.
 En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua como medida de precaución por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
 Si es inhalado: Si aspiró, mueva a la persona al aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
MONTANA SA: (01) 419-3000

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- "Peligroso para organismos acuáticos".
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
- "No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto".
- "Respetar una banda de no aplicación, hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros".
- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada".
- "El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables".
- "En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas".

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **KOPASSUS** es un fungicida sistémico y translaminar de acción preventiva, curativa y erradicante. Está compuesto por dos ingredientes activos con modos de acción complementarios a fin de lograr un control sobre las enfermedades. Pyraclostrobin y Boscalid actúan inhibiendo la respiración mitocondrial del hongo pero en diferentes sitios de acción provocando la muerte del patógeno debido a que impiden la producción de energía (síntesis de ATP). Además, Boscalid regula la producción de compuestos esenciales para la síntesis de aminoácidos y grasas impidiendo el crecimiento del hongo. De esta manera **KOPASSUS** actúa sobre las diferentes etapas de desarrollo del hongo; inhibiendo la germinación de conidias (esporas), el crecimiento del tubo germinativo, la esporulación, la formación del apresorio y el desarrollo del micelio del hongo.
- **KOPASSUS** se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o $\frac{3}{4}$ partes de su capacidad, hacer una pre-mezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.
- **KOPASSUS** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Enfermedad		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/200L	Kg/Ha		
Vid	Oidio	<i>Erysiphe necator</i>	0.16 - 0.18	0.8 - 0.9	14	2.0* 5.0**
Arándano	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.26 - 0.4	0.80	1	4.0* 15.0**
Mandarino	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1.0 - 1.2	14	2.0* 2.0**
Palto	"Moho gris" o "Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1.0 - 1.2	15	0.2* 1.5**

PC: Periodo de carencia
 LMR: Límite máximo de residuos
 * Pyraclostrobin ** Boscalid

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- En vid se recomienda realizar hasta 2 aplicaciones por campaña con una campaña al año, considerando una frecuencia entre aplicaciones de 10 días. Gasto de agua de 1000 litros.
- En arándano se recomienda realizar hasta 2 aplicaciones/ campaña/ año. Intervalo entre aplicaciones: 15 días.
- En mandarino se recomienda realizar 1 aplicación/campaña/año. Gasto de agua de 1600 litros.
- En palto se recomienda realizar 2 aplicaciones/campaña/año. Intervalo entre aplicaciones: 15 a 20 días.
- Se recomienda aplicar la menor dosis de manera preventiva, y la mayor dosis cuando se observen síntomas o se den condiciones favorables para el desarrollo de la plaga.
- Utilizar un volumen apropiado de agua a fin de lograr una adecuada cobertura sobre toda la planta.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

KOPASSUS es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee utilizar.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

