

# FosfiAdvance® 40-20

## FERTILIZANTE FOLIAR Y RADICULAR CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN		
INGREDIENTES	CONTENIDO	
Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	40 % p/p	54 % p/v
Potasio (K <sub>2</sub> O)	20 % p/p	27 % p/v
Ácido Salicílico	0,07 % p/p	0,1 % p/v

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS	
PARÁMETRO	VALOR
Solubilidad en agua a 20 °C	> 99 %
pH	2,1
Densidad a 20 °C	1.360 g/L

Metales pesados: Pb < 20,0 ppm; As < 20,0 ppm; Cd < 2,0 ppm; Hg < 2,0 ppm

DOSIS Y APLICACIÓN FOLIAR				
CULTIVO	DOSIS/100 L	DOSIS/ha	Nº APLICACIONES	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Arándanos y berries	200 - 300 cc	2 - 4 L	4	Inicio de floración, repetir cada 10 días
Avellano europeo	200 - 300 cc	3 - 4 L	3	Inicio de brotación, repetir cada 15 días
Almendro, Ciruelo, Duraznos, Nectarinos	200 - 300 cc	3 - 5 L	3	Inicio de floración, repetir cada 10 días
Cerezos	200 - 300 cc	3 - 5 L	3	A partir de frutos cuajados
Cítricos	200 - 300 cc	3 - 5 L	4	Inicio floración, cada 10 días
Hortalizas en general	400 - 500 cc	2 - 3 L	2	A partir de hojas verdaderas, cada 7 días
Kiwi	200 - 300 cc	3 - 5 L	4	Inicio de brotación, repetir cada 10 días
Nogal	150 - 200 cc	3 - 4 L	5	Inicio de brotación, repetir cada 10 días
Olivos	200 cc	3 - 4 L	3	Aplicar antes de floración, repetir cada 15 días
Papas	400 - 500 cc	3 - 4 L	3	20 días post emergencia, repetir cada 15 días
Palto	200 - 300 cc	6 - 10 L	4	Inicio de crecimiento vegetativo, repetir cada 10 días
Pomáceas	200 - 300 cc	3 - 5 L	3	A partir de frutos de 2 cm, repetir cada 10 días
Tomate, pimentón, ají	400 - 500 cc	2 - 3 L	2	15 días post trasplante, repetir a los 15 días
Vid de mesa	200 - 300 cc	3 - 5 L	3	Brotos de 5 cm, repetir cada 10 días
Vid vinífera	200 - 300 cc	3 - 5 L	3	Brotos de 5 cm, repetir cada 10 días
Viveros frutales	100 cc	-	5	-

DOSIS Y APLICACIÓN FERTIRRIEGO			
CULTIVO	DOSIS/ha	Nº APLICACIONES	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Frutales	8 L	1	Post cosecha

**Advertencia: Lea cuidadosamente la etiqueta y la ficha técnica del producto previo a su uso.** El uso adecuado del producto y de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta y la ficha técnica no debiese afectar negativamente el crecimiento vegetativo-reproductivo normal, en la mayoría de las situaciones. Sin embargo, diversos factores medioambientales y agronómicos, como el estrés de los cultivos asociados a las altas y bajas temperaturas y/o condiciones secas o excesiva humedad, hacen que sea imposible eliminar todos los riesgos asociados al uso del producto, por lo que el daño al cultivo siempre es posible. Atendida la diversidad de factores que pueden incidir en el cultivo, el cliente siempre deberá aplicar el producto siguiendo las recomendaciones de una institución o persona calificada, tales como pero no limitado a, asesores de cultivos certificados, ingenieros agrónomos o recomendaciones aprobadas en el plan de manejo de nutrientes. En caso de dudas, consulte previamente a su representante del Distribuidor del producto. El cliente es responsable de la conservación, manipulación y utilización adecuada del producto. El incumplimiento de las instrucciones de conservación, manipulación, utilización y, en general, toda aquella información contenida en la etiqueta y ficha técnica del producto, pueden causar daños a los cultivos, animales, el hombre o el medioambiente, no siendo de responsabilidad de Agroadvance® SpA o el vendedor las consecuencias del uso inadecuado del producto en las condiciones señaladas.

### Fertilizante foliar y radicular en base a fosfito de potasio.

#### Recomendaciones de uso:

- Llene el equipo pulverizador con agua a 2/3 de su capacidad.
- Agite y disuelva el producto FosfiAdvance® 40-20.
- Complete con agua al volumen requerido. Una vez preparada la solución aplique inmediatamente al cultivo.
- Aplique con un volumen suficiente de agua que permita asperjar copa y frutos.
- Evite las horas de temperaturas extremas (bajo 2 °C o sobre los 25 °C) y/o días con humedad relativa alta o donde ha ocurrido helada, por la sensibilidad de la epidermis del fruto.
- No olvide tomar las debidas medidas de seguridad para cada aplicación foliar.

#### Fertirriego:

- Agite el producto antes de usar.
- Aplique mediante riego tecnificado en el tercio medio del riego.
- **Duración:** Por un periodo de 24 meses, a partir de la fecha de elaboración. Conservar en un ambiente fresco y seco hasta su uso. Una vez abierto, es necesario utilizar el producto en su totalidad dentro de las primeras 72 hrs. No almacenar los remanentes.

**Precauciones:** FosfiAdvance® 40-20 no es un producto peligroso pero en contacto con la piel, ingestión o contacto ocular puede provocar efectos nocivos o irritación. Para mayor información consultar hoja de datos de seguridad del producto. En cualquier caso, de intoxicación o efectos adversos, consultar a un médico o contactar a Corporación RITA +562 2777 1994.

**Compatibilidad:** No mezclar con productos de reacción alcalina, emulsiones concentradas, derivados cúpricos y aceites minerales o vegetales. Se recomienda previamente realizar pruebas de reactividad antes de su aplicación. En caso de aplicarlo con productos diferentes a los señalados, consultar previamente su compatibilidad con un asesor experto o al representante del Distribuidor del producto. **Fitotoxicidad:** No presenta, si se aplica según recomendación de la etiqueta y ficha técnica.



No use el producto en forma diferente a lo indicado en esta etiqueta y la ficha técnica.



**AGRO  
ADVANCE®**  
BIOTECNOLOGÍA

Producto fabricado por **Agroadvance SpA**.  
Camino Melipilla 26.200, Peñafiel.  
Fono: +56 2 270 83 377 | www.agroadvance.cl

