

	Etiqueta	Revisión: 09
	BIODELTA - AGRILIFE	Aprobado: JR Fecha: Página:

38,5 ± 0,3

1,1 ± 0,2
1,2 ± 0,2

11,3 ± 0,3
1,6

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo biológico: Microorganismos derivados

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito ni administrar nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0800-13040
ESSALUD: 411 8900 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50647

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranje del producto.
- Respetar la banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia las aguas subterráneas.



AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

NEMATOCIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición:
Pseudomonas fluorescens10 g/kg
(con una potencia de 10⁷ CFU/g de producto)

Aditivos.....c.s.p. 1 Kg

Registro PBUA N° - SENASA



Titular de Registro:
SILVESTRE PERU S.A.C
Calle Arica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 617 - 3300

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE PERU S.A.C.

Formulado por:
AGRILIFE
Plot N°154 x A5-1, SVCIE, IDA Bollaram 502325
Medak Dist. Telangan, India.

Contenido Neto: **10 kg**

F. de Form:
N° Lote:
F. de Venc:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BIODELTA[®] 10 WP es un nematocida en base a la bacteria *Pseudomonas fluorescens* que restringe el crecimiento del patógeno en la raíz de la planta.

BIODELTA[®] 10 WP secreta una enzima, que es capaz de disolver las paredes de la célula del hongo patógeno. Los exudados químicos de la bacteria interfieren con la germinación de esporas y su mecanismo del crecimiento, así se previene su establecimiento en las cosechas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
VID	"Nematodo del nudo"	<i>Meloidogyne incognita</i>	10 - 15	No aplica	No aplica

PC: Período de Carencia NA: No aplica LMR: Límite Máximo de Residuos

METODO DE APLICACION

BIODELTA[®] 10 WP Preparar una pre-mezcla, diluyendo la cantidad necesaria del producto en un balde, luego vaciar al recipiente definitivo y completar la cantidad de agua. Si es posible dejar la solución reposando entre 30 minutos antes de la aplicación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se aplica en la etapa de brotamiento. Se recomienda realizar como máximo una aplicación por campaña y 1 campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD

BIODELTA[®] 10 WP es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

BIODELTA[®] 10 WP no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



L.TRICOX	L.TRICOX	L. SILVESTRE L. TRICOX T. LAVADO B. TOXICOLÓGICA	T. LAVADO	TEXTO
				
PANTONE 152 C	PANTONE 382 C	PANTONE 348 C	PANTONE 293 C	P. Process Black

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE