

25.7 cm x 14.2 cm (Botellas DN50 o DN63 / COEX - HDPE)

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en un lugar sombreado, fresco y seco, bajo llave en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. No almacenar en casa habitada.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa limpia y protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada después de transcurridos 24 horas.
- Evitar su inhalación, el contacto directo con la piel y los ojos.
- Perjudicial si se ingiere. Evitar la ingestión del producto.
- No pulverizar contra el viento.
- El producto es levemente irritante para los ojos y la piel.
- No aplicar en presencia de niños, personas en general y animales domésticos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación: llame inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos: lavar los ojos con abundante agua limpia y fresca durante 10 minutos por lo menos, manteniendo los párpados abiertos si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel: quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión: no administrar nada por la boca a una persona inconsciente. No inducir al vómito.
- En caso de inhalación: retirar al accidentado al aire libre, mantenerlo en reposo. Si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial.
- Teléfono de Emergencia: SAMU: 106. Agrilab Perú S.A.C.: (01) 262-8659.
- Nota para el médico: No existe antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Respetar la dosis y época de aplicación del producto.
- No vierta remanente del producto ni los envases vacíos o agua de lavado del equipo de aplicación en suelos, ríos, lagos, lagunas u otros cuerpos de agua.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



YAKARTA[®]

22.25 EC

EXTRACTO VEGETAL

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Aceite de árbol del Té.....222,5 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1 L

Reg. N° XXX-SENASA-PBA-EV

Titular de Registro: **AGRILAB PERÚ S.R.L.**
Jirón Sáenz Peña 355. Dpto. 105
Magdalena del Mar. Lima - Perú.
Teléfono: (01) 363-8659

Formulador: **SPACHEM S.L.**
Pol. Ind. Guadasequies 46839
uadasequies, Valencia - España

Importador/distribuidor: **AGRILAB PERÚ S.R.L.**
Jirón Sáenz Peña 355. Dpto. 105
Magdalena del Mar. Lima - Perú.
Teléfono: (01) 363-8659

Fecha de formulación:
N° de lote:
Contenido Neto: 1 L
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

YAKARTA 22.25 EC es un fungicida a base de Aceite del Árbol de Té (*Melaleuca alternifolia*). Posee actividad preventiva (por inhibir la germinación de las esporas), curativa (por controlar el crecimiento del micelio impidiendo el desarrollo y la expansión de las lesiones) mediante supresión y erradicación de colonias de los patógenos presentes en los frutos y hojas.

Preparación y aplicación

YAKARTA 22.25 EC se prepara diluyendo la dosis recomendada en un recipiente previo con agua, luego esta dilución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, manteniendo en marcha el sistema de agitación. Aplicar cuando las condiciones climáticas sean favorables. No en horas de máxima insolación. No aplicar si se pronostica lluvia dentro de las 4 horas después de la aplicación. Se recomienda que el pH del agua para mezcla sea 5,8.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Palto	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.75 - 2	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia (días) LMR: Límite máximo de residuo (ppm)
N.A.: No aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: En Palto, se puede utilizar como máximo 2 aplicaciones por campaña / año. Utilizar dosis mínima en aplicaciones preventivas con intervalos de 5 - 7 días y utilizar dosis máxima en aplicaciones curativas con intervalos de 5 días. Se recomienda aplicar cuando el cultivo se encuentre en floración.

PERIODO DE REINGRESO:
No reingresar al área tratada hasta 4 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
De preferencia aplicar este producto solo. Se recomienda efectuar una confirmación previa de compatibilidad antes de mezclar con otros productos.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

