



STYMULUS MAXX™

Bioestimulante con macro y micronutrientes quelados

Líquido soluble (SL)

Extracto de algas 20% (*Ascophyllum nodosum*)
-basado en Sólidos Puros Totales-

Induce fitohormonas y contiene carbohidratos.

Composición química:

Nitrógeno (N)	3.6% p/v (3.2% p/p)	Metales Pesados:	mg/kg
Potasio (K ₂ O)	4.1% p/v (3.6% p/p)	Arsénico (As)	7.1
Fósforo (P ₂ O ₅)	1.5% p/v (1.3% p/p)	Cadmio (Cd)	<1.9
Boro (B)	0.05% p/v (0.05% p/p)	Plomo (Pb)	<2.0
Cobre EDTA (Cu)	0.004% p/v (0.003% p/p)	Mercurio (Hg)	<0.3
Hierro EDTA (Fe)	0.034% p/v (0.03% p/p)		
Manganeso EDTA (Mn)	0.029% p/v (0.026% p/p)		
Molibdeno (Mo)	0.002% p/v (0.001% p/p)		
Zinc EDTA (Zn)	0.01% p/v (0.009% p/p)		

Parámetro	Resultado
pH	7.0 - 9.0
Densidad (g/ L)	1120 - 1140

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

FABRICADO Y FORMULADO POR:

FMC Agro Ltd
Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH,
REINO UNIDO.
Tel.: (44) 1244537370.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

FMC QUÍMICA CHILE LTDA.
Av. Vitacura 2670, piso 15, oficina 1501
Las Condes, Santiago



CONTENIDO NETO: 10 litros

NÚMERO DE LOTE: ver envase

FECHA DE FORMULACIÓN: ver envase

FECHA DE VENCIMIENTO: ver envase

15132914 Chile
21082023

STYMULUS MAX 10L Chile 15132914_21-08-23.indd 1

21/08/2023 17:12:00

	Producto: RT / CRT - STYMULUS MAXX	CORES:
	País: Brasil - Origen: Chile	■ PRETO
	Revisão: Rev02 - 21/08/23	■ PANTONE Red 032 U
	SKU label atual: 15132914 / 22048368	Fundo - Cores em CMYK
	SKU label novo: 15132914 / 22048368	
JOB: 257/23		
Formato: 190 mm x 150 mm		
Alterações:	- Reemplazar Pb: < 1.9 por Pb: < 2.0 - En el cuadro de instrucciones de uso, colocar el cultivo "Palto", sobre la fila de "Pomáceas". (06/07/23 - Ana Silva)	

Stymulus Maxx™ es un formulado en forma de líquido soluble concentrado, a base de extractos naturales de algas marinas, ricos en componentes naturales que promueven el crecimiento del cultivo. Está formulado con nitrógeno y fósforo, así como una mezcla de micronutrientes esenciales fácilmente absorbibles por la planta. Las algas originarias de este producto son cultivadas por medio de técnicas sostenibles y proceden de Irlanda del Norte. Mejora la eficiencia del uso de nutrientes y la calidad de los cultivos. Con la correcta aplicación de Stymulus Maxx se mejora la nutrición así como el vigor del cultivo, optimizándose el rendimiento potencial del mismo y la superación de los daños sufridos por situaciones de estrés.

MODO DE PREPARACIÓN: Stymulus Maxx™ puede ser aplicado foliar sólo o en conjunto con aspersiones de reguladores de crecimiento, plaguicidas y otros fertilizantes foliares líquidos.

Siempre se aplica con suficiente agua para asegurar un cubrimiento uniforme sin causar escurrimiento en las hojas.

Antes de abrir el recipiente, agitar bien. Llenar el tanque de mezcla hasta la mitad con agua e iniciar la agitación. Agregar la cantidad de producto requerido y luego el resto del agua. Mantener la agitación del tanque durante todo el proceso de aspersión en el campo.

No aplicar este producto en condiciones de radiación fuerte, o temperaturas extremas. En caso de ser necesario, haga la aplicación durante las últimas horas de la tarde o bien en las primeras horas de la mañana.

Limpie el tanque de aplicación después de su uso.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a los cultivos, a la dosis y las diluciones indicadas en esta etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de las soluciones de fertilizantes o con la mayoría de agroquímicos siempre y cuando estén registrados y autorizados en los cultivos a aplicar. Tome precaución al combinar con mezclas multiproducto.

Tome precauciones en mezclas con productos de alta reacción ácida.

Cuando desconozca la compatibilidad de alguna mezcla, debe hacerse una prueba previa.

En caso de duda consulte con su distribuidor o la página web del fabricante.

PRECAUCIONES:

Almacene y transporte el producto en lugares frescos, secos y aireados, manténgalo fuera de la adición solar directa, proteger contra la congelación, por encima de 5 °C, lejos de alimentos, forrajes y medicinas. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Manténgalo en su envase original, cerrado herméticamente y etiquetado. No contamine ríos, lagos y estanques con este producto, con sus envases ni empaques.

Eliminar el contenido/recipiente en lugares adecuados. Evitar la respiración del spray. Use los equipos de protección personal necesarios. Si se produce irritación en la piel: acudir al médico. Puede provocar una reacción alérgica.

AVISO DE GARANTÍA:

La Compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor garantizan el contenido de este envase, siempre que se encuentre en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. No es posible controlar aspectos importantes en el transporte, almacenamiento y uso de este producto por lo cual el fabricante no asume responsabilidades por estos conceptos. Sólo se garantiza el contenido inalterable del producto de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta y el uso recomendado en la misma. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.

Cultivo		Dosis/aplicación
Palto		2.0-4.0 l/ha
Pomáceas	Manzana, Pera, Membrillero.	
Carozos	Damasco, Durazno, Cerezo, Ciruelo, Nectarino, Níspero.	
Frutales de grano	Higo, Kiwi.	2.0-5.0 l/ha
Fruta seca	Nogal, Almendro, Avellano.	
Berries	Frutillas, Moras, Arándanos, Frambuesas, Zarpaparrillas o Grosella, Frutilla chilena, Murtilla, Maqui.	2.0-4.0 l/ha
Cítricos	Naranja, Mandarino, Limón, Pomelo, Lima.	2.0-4.0 l/ha
Viña	Vinícola y de mesa.	
Cereales de invierno y verano	Maíz, Trigo, Triticale, Avena, Cebada, Sorgo.	1.5-3.0 l/ha
Oleaginosas (otoño y primavera) y otros industriales	Girasol, Canola.	
Tubérculos	Papa.	2.0-4.0 L/ha
Leguminosas	Lupino, Soja, Frijol y otras judías, Alfalfa, Haba.	1.5-3.0 l/ha
Hortícolas	Melón, Sandía, Pepino, Calabaza y otras cucurbitáceas, Tomate, Berenjena y otras y Otras crucíferas, Ajo, Cebolla, Puerro, Esparrago, Espinaca, Remolacha, Zanahoria, solanáceas, Coliflor Col, Brócoli, Mostaza, Apio, Alcachofa, Lechuga, Escarola.	1.5-3.0 l/ha
Flores y ornamentales		0.25-0.5%

Puede repetir las aplicaciones cada 7-10 días, como sea requerido para satisfacer las necesidades nutricionales del cultivo. Termine su programa de aplicaciones 10 días antes de cosecha. En cereales 1.5 L/ha a GS13-23 y repetir a 3 L/ha a GS 30-31. Los trigos se benefician con una aplicación de 3 L/ha a GS47-71. En cítricos, frutales, viña, berries, fruta seca, primer tratamiento antes de floración y desde caída de pétalos hasta cosecha. En papa aplicar en los momentos determinantes del cultivo, desarrollo vegetativo, inicio de tuberización y durante el llenado. En cultivos extensivos, a partir de que haya la suficiente superficie foliar (aproximadamente 21 días después de emergencia).

En maíz a partir de la 4ª hoja pudiéndose repetir a lo largo del ciclo. En hortalizas, aplicar desde el trasplante repitiendo los tratamientos a lo largo del ciclo si es requerido.

El estado nutricional de su cultivo es único, y puede variar en función de la rotación de los cultivos, y otras circunstancias (estado del suelo, meteorología, gestión de la fertilización y otras ...). Usar un mínimo de 200 L/ha de agua asegurando un buen cubrimiento del follaje de las plantas. Consulte con su asesor o distribuidor en todo momento en caso de duda.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Aplicación foliar terrestre/ aérea y fertirrigación. Para aplicaciones aéreas usar de 40-60 l agua/ha. Para aplicaciones terrestres usar al menos 200 L/ha.

22048368 Chile
21082023