

Descripción general del producto

Nutrafeed® Top Boro Plus es un fertilizante foliar líquido, que está formulado como concentrado soluble de alta pureza. Contiene Boro, enriquecido con ácidos carboxílicos y polioles. Dada esta propiedad, la corrección es altamente eficiente.

Nutrafeed® Top Boro Plus es un fertilizante foliar complejoado con azúcares alcohol lo que permite una alta absorción y translocación del nutriente al interior de la planta.

Composición Nutrafeed® Top Boro Plus

Boro (B) 15 % p/v, complejoado con ácidos carboxílicos 3,0% p/v y Polioles 0,5% p/v.

Parámetros Físicoquímicos Nutrafeed® Top Boro Plus

pH directo: 7,0 - 8,0; Solubilidad (20°C) : 100%; Densidad (20°C) g/L: 1388

Elementos acompañantes en Nutrafeed® Top Boro Plus (Límites Máximos en mg/kg)

Pb <0,029; Cd <0,014; As <0,5; Hg <0,013



Top Boro Plus

Fertilizante Foliar

Corrector nutricional a base de Boro complejoado con Ácidos Carboxílicos

Precauciones de Almacenamiento, Transporte y Aplicación: No dejar al alcance de niños o personas sin experiencia en el uso de estos productos. Almacenar bajo llave, en un lugar fresco y seco, especialmente diseñado para este fin. No almacenar ni transportar junto alimentos, personas o animales. No reutilizar el envase. Para su preparación y aplicación, usar elementos de protección personal; mascarilla, guantes, gafas y traje, impermeables.

REALIZAR TRIPLE LAVADO ANTES DE ELIMINAR LOS ENVASES.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS EN FUENTES DE AGUA NATURALES.

NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CON PERSONAS, ANIMALES O ALIMENTOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN TRASLADAR AL AFECTADO A UN CENTRO EMERGENCIA Y MOSTRAR LA ETIQUETA AL PERSONAL DE SALUD.

Primeros Auxilios: Producto no tóxico para personas, plantas o animales en las condiciones habituales de uso. Si es ingerido accidentalmente, trasladar al paciente al servicio de emergencia llevando la etiqueta del producto. Tratamiento sintomático. En caso de contacto con la piel y ojos, lavar con abundante agua la zona afectada. En caso de surgir algún tipo de reacción alérgica, asistir al médico. En caso de inhalar vapores de aplicación, retirarse del lugar y lavar partes expuestas del cuerpo. No se requiere tratamiento especial.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.

Producido por Fainvet Ltda.
para Nutratec SpA.
Las Palmas 167, San Bernardo - Chile
www.nutrafeed.cl



Ficha técnica
y hoja de seguridad
escanee el código QR

Recomendaciones de uso Nutrafeed® Top Boro Plus

Cultivo	Dosis l/ha	Dosis cc/ha	Época de aplicación
Vid de mesa y Vinífera	1 - 2	100 - 300	Desde brotación a inicio de flor. Inicio de pinta y precosecha.
Cerezo, Nectarino y Ciruelo	1 - 2	100 - 300	Desde botón floral, fruto cuajado y poscosecha.
Pomáceasy Kiwi	1 - 2	100 - 300	Desde botón floral, fruto cuajado y poscosecha.
Nogal, Almendro y Avellano	1 - 2	100 - 300	Desde floración en adelante.
Frutilla, Frambueso, Arándano, Mora	1 - 2	100 - 300	Realizar 2 a 3 aplicaciones desde inicio de flor cada 7 a 10 días.
Palto, Cítricos y Olivo	1 - 2	100 - 300	Aplicar desde floración en adelante. 2 aplicaciones.
Coliflor, Brócoli, Repollo.	1 - 2	100 - 300	Aplicar en estado de roseta y a inicios de formación del pan.
Tomate, Pimentón, Melón, Sandía, Zapallo	1 - 2	100 - 300	Realizar 2 a 3 aplicaciones desde inicio de floración.
Papa	1 - 2	100 - 300	Desde crecimiento vegetativo e inicio tuberización.
Maíz	1 - 2	100 - 300	Aplicar en aparición de la panoja.
Trigo, Avena y otros cereales.	1 - 2	100 - 300	Aplica en hoja de bandera. 2 aplicaciones.

Preparación de Top Boro Plus para aplicación: El producto puede aplicarse vía foliar a través de cualquier medio de aspersión habitual, siempre respetando las dosis e indicaciones de mojamiento y/o concentración indicados. Agitar convenientemente en envase antes de usar. En el tanque de aplicación, conteniendo agua limpia a su media capacidad y pH acondicionado si se requiere, dosificar el producto con los agitadores funcionando. Enjuagar al menos tres veces el envase con agua limpia y verter el contenido en el mismo tanque y completar el volumen de agua requerido. **Mezclas de tanque:** Si espera aplicar en mezcla, adicionar primero Top Boro Plus y luego el resto de los productos. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previas.

Compatibilidad: El producto es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común, no obstante, se recomienda siempre realizar pruebas previas de compatibilidad para mezclas desconocidas. **Fitotoxicidad:** El producto no es fitotóxico si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de uso. **Tiempo de reingreso al área tratada:** No tiene restricciones, pero siempre se recomienda no reingresar a un área tratada hasta que ésta se haya secado.

Carencia: No corresponde.

Nota al Comprador: El fabricante garantiza que el producto contenido en el envase sin abrir, se ajusta a la especificación declarada y que las recomendaciones están en concordancia con la experiencia práctica del uso del producto. No obstante, al no poder controlar el almacenamiento, manejo y condiciones de su uso, no puede dar garantía expresa o implícita de los resultados obtenidos, efectos o eventuales daños que pudieran derivar de su uso. El uso del producto implica que el comprador acepta estas condiciones de venta.

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR