

impala®

50 CE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición:

Imazalil 500 g/L
Aditivos c.s.p g/L

Registro N°xxxx-SENASA

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Este producto es dañino no ingerir.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Peligroso si es inhalado.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.
- Causa daño irreversible a los ojos.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Evite el contacto con la piel y las mucosas. Puede causar irritación a los ojos.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Imidazole
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar el paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos; si la irritación es grave, buscar asistencia médica. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No se ha determinado antídoto específico.
- Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX 0-800-1-3040
POINT ANDINA S.A. (01) 348-1018

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

IMPALA 50 CE es un moderno fungicida sistémico, efectivo para el control de hongos como Fusarium y mildiu y para tratamiento post cosecha en frutos.

IMPALA 50 CE penetra muy fácilmente dentro de los tejidos de la planta permitiendo un control efectivo sobre los hongos.

IMPALA 50 CE se emplea también para la desinfección de semillas, camas de almácigo o campo definitivo.

IMPALA 50 CE debe aplicarse a los primeros síntomas de la enfermedad, la aplicación debe ser dirigida al pie de planta realizando una buena cobertura.

IMPALA 50 CE se emplea diluido en agua limpia. Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada del producto en un balde con agua; luego vaciar al tanque de aplicación, completar el volumen de agua a utilizar y agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar al momento de siembra y al transplante del cultivo. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña y 2 campañas por año.

PERIODO DE REINGRESO

Se puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

IMPALA 50 CE es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No se han reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos cuando es usado a las dosis recomendadas en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cuadro de usos:

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS ml / 200 L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	Fusarium	<i>Fusarium moniliforme</i>	200	Nd	0.05
Te	Fusarium	<i>Fusarium oxysporum</i>	200	Nd	0.1
Rosas	Mildiu	<i>Peronospora sparsa</i>	150 - 200	NA	NA
Vid	Hongo de la madera	<i>Botryosphaeria obtusa</i>	200	14	0.05

DESINFECCIÓN DE SEMILLAS:

Cebada	Fusarium	<i>Fusarium graminearum</i>	2-4 ml/Kg de semilla	Nd	0.05
	Helminthosporium	<i>Helminthosporium sativum</i>	2-4 ml/Kg de semilla	Nd	0.05

POST COSECHA:

Mandarina	Moho verde	<i>Penicillium digitatum</i>	0.4 - 0.6 %	Nd	5
-----------	------------	------------------------------	-------------	----	---

LMR: Límite Máximo de Residuos. PC: Período de Carencia Nd: No disponible

FORMULADO POR:
Point International Ltd.
42 St. Margarets Grove,
Twickenham Tw1 1JG, United Kingdom
Telf: 44 (208)892-3862

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Soluciones Técnicas Del Agro S.A.C.
Av. Guillermo Dansey 2176
Lima Cercado - Perú
Telf: (01) 3368645

Softagro
Soluciones Técnicas del Agro S.A.C.

Número de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

CONTENIDO
NETO: 50 L

® Marca Registrada

TITULAR DEL REGISTRO: POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto Mz A6 Lote 15 Urb. Santa Patricia
II Etapa. La Molina. Lima Perú
Teléfono 348-1018 / 348-9609

NO CORROSIVO - INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

