

**Bioestimulante único que
mejora la floración y el cuajado.**

**N° registro
1084-F-AGR-P**

Descripción

Florastart es un bioestimulante diseñado específicamente para mejorar la fase de floración, promover la producción de polen y la fertilidad, además de mejorar el cuajado de los frutos. Esto se logra gracias a una fórmula única que bioestimula la planta con aminoácidos libres L-α, proporciona fósforo (P) y potasio (K) para potenciar la energía de la planta y estimularla a avanzar a la siguiente etapa de crecimiento. El alto contenido de boro (B) y molibdeno (Mo) ayuda a la diferenciación de los brotes promoviendo una floración vigorosa y fértil del polen.

La sinergia entre P, K y Mo también ayuda a las plantas a superar las dificultades asociadas con el crecimiento vigoroso o el retraso de la floración debido al exceso de nitrógeno en el cultivo.

Principales beneficios

- ▶ Potencia la fertilidad de las flores y el cuajado de los frutos
- ▶ Mejora la calidad de la fruta cuajada
- ▶ Aumenta el movimiento de azúcares hacia frutos y tubérculos
- ▶ Mejora la eficiencia del uso de nitrógeno y reduce problemas asociados con el exceso de nitrato
- ▶ Florastart puede utilizarse en la mayoría de los cultivos y se recomienda específicamente para aplicación foliar, pero también es posible utilizarlo en fertirrigación.

Especificaciones técnicas

Fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua	9,50 % p/p
Potasio (K ₂ O) soluble en agua	12,60 % p/p
Boro (B) soluble en agua	8,00 % p/p
Molibdeno (Mo) soluble en agua	10,00 % p/p
Aminoácidos libres	5,00 % p/p

Teléfono: +593 999142097
servicioalcliente@rodel.rovensa.com
www.rovensanext-latam.com

Pasaje de la Paz E9-01 y Av. 6 de Diciembre
Quito - Ecuador



Dosis y métodos de uso

Aplicación al suelo / Fertirrigación		
Piña	1 - 2 kg /ha	Realizar la primera aplicación después de la inducción antes de la oración; a los 20-30 días la segunda aplicación, a la aparición de la flor.
Rosa, otros ornamentales	1 kg /ha	Realizar aplicaciones en intervalos de 15 días a partir de prepración. Aplicar cada 15 O 20 días.

Aplicación foliar		
Banano	1 - 2 kg/ha	Realizar aplicaciones en intervalos de 12 o 20 días a partir de la prefloración.
Rosa, otros ornamentales	1 kg/ha	Realizar aplicaciones en intervalos de 15 días a partir de la prefloración. Aplicar cada 15 o 20 días.
Brócoli	0,5 - 2 kg/ha	Aplicar desde dos semanas antes del inicio de formación de la cabeza, cada 15 días. Si se presenta la fisiopatía "cola de látigo" o "whiptail" aplicar a intervalos de 7 días.
Papa	1,5 - 2,25 kg/ha	Realizar aplicaciones en intervalos de 15 días a partir de la prefloración.
Tomate, pimiento	0,5 - 1,5 kg /ha	Realizar aplicaciones en intervalos de 15 días a partir de preoración. Aplicar cada 15 o 20 días.
Café, cacao	1,5 - 2,25 kg /ha	Realizar 2 o 3 aplicaciones en intervalos de 15 días a partir de prefloración.
Maíz	0,25 - 0,75 kg /h	2 aplicaciones en el desarrollo vegetativo y al comienzo de la floración.
Arroz, otros cereales	0,5 - 0,75 kg /ha	Realizar 2 o 3 aplicaciones en intervalos de 15 días a partir de prefloración.
Piña	1 - 2 kg /ha	Realizar la primera aplicación después de la inducción antes de la inducción antes de la floración; a los 20-30 días la segunda aplicación a la aparición de la flor.

Compatibilidad
Florastart no presenta incompatibilidad con la mayoría de los fertilizantes y productos fitosanitarios normalmente utilizados, excepto productos que contengan Cu, B y en algunos casos productos potenciadores metabólicos como fosfitos o aminoácidos. Se recomienda evitar ácidos, álcalis o bases fuertes.

Teléfono: +593 999142097
servicioalcliente@rodel.rovensa.com
www.rovensanext-latam.com

Pasaje de la Paz E9-01 y Av. 6 de Diciembre
Quito - Ecuador

Fecha de última actualización: 16/02/2024

