

Precauciones de uso

Producto de baja toxicidad. Sin embargo, usar medidas de protección propias del manejo de un fitosanitario. Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. Utilizar los envases y eliminarlos de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes. No transportar ni almacenar con alimentos. No lavar los envases o equipo de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua. Guardar en lugar fresco y seco.

PRODUCTO HIGROSCOPICO (capaz de absorber humedad del medio).
NO almacenar en ambientes húmedos.

Nota del fabricante

El fabricante garantiza que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta y que las recomendaciones de uso indicadas son meramente referenciales. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.

Metales pesados

- Arsénico < 0,5 ppm
- Cadmio < 0,5 ppm
- Mercurio < 0,5 ppm
- Plomo < 0,5 ppm

Fabricado por:

Agrospec®

Origen: Chile

- Lote N°: 2404-100218 / 035
- Contenido neto: 10 Kg
- Fecha fabric./Fecha venc.: 04/2024 / 04-2026

En caso de intoxicación llamar:
Centro de Información Toxicológica UC (CITUC): 56 2 2635 3800 (24 horas)

Magro 257, Maipú,
1115
154 8000

Composición

Potasio (K ₂ O)	p/p %
38,6	

Propiedades

Densidad (a 20°C)	1,22 g/mL
pH (10%)	8,64
Solubilidad en agua (a 20°C)	>200 g/L



Principales características

Kactiv es un fertilizante foliar 100% soluble, formulado en base a potasio alto, permite una rápida absorción por parte de la planta y/o frutos. Su aplicación asegura tamaño y uniformidad de los frutos, cuando es aplicado en los momentos oportunos.

Recomendaciones de uso

Aplicación foliar

Cultivo	Dosis		Observaciones
	g/100 L	kg/ha	
Vid de mesa	150 - 250		Aplicar desde inicio de brotación a pleno desarrollo. Mojar la planta evitando el escurrimiento. Desde la pinta hasta el escudo. Mojar la espaldara.
Vid vinífera	250 - 350		Aplicar desde pinta a precosecha, cuando el cultivo esté en desarrollo. Evitar la aplicación en días de lluvia. Mojar la espaldara.
Vid de mesa	—	3,75	Aplicar desde pinta a precosecha, cuando el cultivo esté en desarrollo. Evitar la aplicación en días de lluvia. Mojar la espaldara.
Cerezo	200 - 350	3 min.	Aplicar desde caída de pétalos a precosecha. Mojar la planta evitando el escurrimiento. Desde la pinta hasta el escudo. Mojar la espaldara.
Ciruelo	250	—	Aplicar desde inicio de brotación, cuando el cultivo esté en desarrollo. Mojar la planta evitando el escurrimiento. Desde la pinta hasta el escudo. Mojar la espaldara.
Damasco	350	2,1 - 3,5	Aplicar desde inicio de floración a precosecha. Mojar la planta evitando el escurrimiento. Desde la pinta hasta el escudo. Mojar la espaldara.
Duraznero	350	2,1 - 2,3	Aplicar desde inicio de floración a precosecha. Mojar la planta evitando el escurrimiento. Desde la pinta hasta el escudo. Mojar la espaldara.
Nectarino	250 - 400	2 min.	Aplicar desde el inicio del cultivo hasta la cosecha. Mojar la planta evitando el escurrimiento. Mojar la espaldara.
Mandarino	250	—	Aplicar desde inicio de brotación, cuando el cultivo esté en desarrollo. Mojar la planta evitando el escurrimiento. Desde la pinta hasta el escudo. Mojar la espaldara.
Arándano	350	2,1 - 3,5	Aplicar desde inicio de floración a precosecha. Mojar la planta evitando el escurrimiento. Desde la pinta hasta el escudo. Mojar la espaldara.
Frambueso	350	2,1 - 2,3	Aplicar desde inicio de floración a precosecha. Mojar la planta evitando el escurrimiento. Desde la pinta hasta el escudo. Mojar la espaldara.
Frutilla	250 - 400	2 min.	Aplicar desde el inicio del cultivo hasta la cosecha. Mojar la planta evitando el escurrimiento. Mojar la espaldara.
Pimentón	250 - 400	2 min.	Aplicar desde el inicio del cultivo hasta la cosecha. Mojar la planta evitando el escurrimiento. Mojar la espaldara.
Tomate	250 - 400	2 min.	Aplicar desde el inicio del cultivo hasta la cosecha. Mojar la planta evitando el escurrimiento. Mojar la espaldara.

Instrucciones de uso

- Considerar un volumen de agua para mojar todo el follaje y aplicar con equipos adecuados.
- El escurrimiento o sobredosis de producto pueden generar depósitos visuales.
- No aplicar con temperaturas mayores a 25°C. En mandarineros, no aplicar con temperaturas mayores a 20°C.
- Llenar con agua el estanque hasta la mitad del volumen requerido. Con el agua agregar la cantidad requerida de Kactiv y completar el volumen de agua.
- No acidificar.

Fitotoxicidad

- No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.
- Es posible observar temporalmente depósitos blancos sobre bayas o frutos cuando se aplica en días de lluvia.

Compatibilidad

- Compatible con surfactantes neutros.
- Se recomienda aplicar solo. En caso de requerir mezclar, consultar al Departamento de Agronomía.

Incompatibilidad

- No se recomienda aplicar en mezcla con productos de acción penetrante.
- Incompatible con productos de reacción ácida.

Agrospec®