



FICHA TECNICA

TIPO DE AGROINSUMO: Fungicida biológico	SINÓNIMO: Biofungicida	FORMULACIÓN: Polvo humectable	pH DE LA FORMULACIÓN: 7.90
NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO: ESPORALIS®		COLOR: Beige	SOLUBILIDAD EN AGUA: Mojable
PRINCIPALES COMPUESTOS DE LA FORMULACIÓN: Esporas de <i>Trichoderma viride</i>		FAMILIA QUÍMICA: No aplica	FÓRMULA QUÍMICA CONDENSADA: No aplica

MODO DE ACCIÓN:

ESPORALIS® inhibe el crecimiento de hongos fitopatógenos presentes en el suelo mediante antibiosis, hiperparasitismo y competencia.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
<i>Trichoderma viride</i> en soporte sólido, para un contenido de (1.4×10^6) UFC/g).	10.00
INGREDIENTES INERTES:	
Estabilizantes y diluyentes.	90.00
TOTAL	100.00

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 5 PRECAUCIÓN	RESIDUALIDAD: Escasa	REGISTRO OFICIAL: RSCO-FUNG-0301R-X0187-002-10.0
--	--------------------------------	--

USO: Agrícola.

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PATÓGENOS AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS/ha	INTERVALO DE SEGURIDAD
Solanáceas Berenjena Chile Chile bell Jitomate Papa Tomate de cascara	Marchitez (<i>Fusarium</i> sp)	2.0 - 2.5 Kg	Sin Limite

Observaciones: Realizar tres aplicaciones a intervalos de 14 días a través del sistema de riego.



Tiempo de reentrada a campos tratados: 4 horas.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS:

Leer la etiqueta cuidadosamente y seguir las indicaciones de uso.

PRESENTACIONES COMERCIALES:

Bolsas de 0.5 kg

RESPONSABLE DEL PRODUCTO:



**LIDAG
S.A. de C.V.**

Niza 3102 Col. Narvarte, Monterrey, N.L.
México, C.P. 64830

Tels. (81) 8359 5858 y (81) 8359 5810
E-mail: info@lidag.com y ventas@lidag.com
www.lidag.com

