

VINTAC

8 0 S P

BIOESTIMULANTE

INGREDIENTE	% (p/p)
Aminoácidos totales	82
Carbono orgánico	50,8
Nitrógeno (N) orgánico	16,8
Nitrógeno (N) total	16,8

✓ 100% L-Aminoácidos de origen vegetal

COMPOSICIÓN FÍSICOQUÍMICA


Densidad a 20°C: 510 g/l
pH al 1,0%: 4,8
Solubilidad en agua a 20 °C: 100%

Metales pesados:
Cadmio (Cd) <0,5 mg/kg; Mercurio (Hg) <0,5 mg/kg;
Plomo (Pb) <0,5 mg/kg; Arsénico (As) <0,5 mg/kg

Formulación Polvo Soluble (SP)
Modo de Acción Absorción foliar y radicular

Contenido: **20 kg**

BOAMERICA



VINTAC
8 0 S P



Absorción foliar
y radicular



Soluble en
agua

CARACTERÍSTICAS:

VINTAC 80 SP es un bioestimulante polvo en base a una alta concentración de L-aminoácidos libres de origen vegetal. Cuenta con una formulación específica, creada con el objetivo de estimular naturalmente el crecimiento vegetal y superar condiciones de estrés en frutales y cultivos.

VINTAC 80 SP en mezclas con fitosanitarios potencia su eficiencia e incrementa los efectos en el metabolismo vegetal.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	APLICACIÓN	Dosis kg/ha	Concentración gr/100 l
Uva de Mesa	Aplicar desde brotación, crecimiento de bayas y en precosecha. 2 aplicaciones en brotación y 1 en pinta.	0,3 - 1,0	30 - 80
Uva Vinífera			
Cítricos y Paltos	Aplicar principalmente en pre floración, cuaja, crecimiento de frutos y durante el resto de la temporada.		
Cerezos, Carozos, Nogales y Avellanos	4 aplicaciones: en brotación, cuajado, raleo y desarrollo de fruto.		
Manzanos, Perales y Kiwis	En brotación, crecimiento de frutos y post cosecha.		
Arándano, Frambuesa y Frutilla	En brotación, crecimiento de frutos y post cosecha.		
Olivo	3 aplicaciones durante el crecimiento de los frutos y durante todo el ciclo del cultivo.	0,25 - 0,5	
Huertos en formación y Viveros	Cada 15 a 20 días desde inicio de brotación.		
Papa	4 aplicaciones durante el ciclo de cultivo.		
Arroz, Trigo y Cebada	2 aplicaciones: Inicio de macolla y llenado de grano. Durante todo el ciclo de cultivo.		
Alfalfa	Después del segundo corte. Aplicar 7-10 días después de cada corte. 2 a 3 aplicaciones.		
Hortalizas y Tomate de Industria	Aplicaciones cada 20 días.		
Tomate	3 - 4 aplicaciones durante el ciclo de cultivo.		
Melón y Sandía	Aplicaciones durante todo el ciclo del cultivo		

Vía riego: 2-4 kg/ha por temporada en Hortalizas, Cultivos y Berries, 3-5 kg/ha por temporada en Frutales.

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

VINTAC 80 SP se aplica mediante aspersión foliar. Se debe utilizar suficiente agua para mojar todo el follaje de las plantas, y se debe evitar aplicar con temperaturas extremas. También se puede aplicar vía fertirriego.

VINTAC 80 SP es compatible con la mayoría de los fertilizantes foliares y fitosanitarios comúnmente utilizados. Con excepción de aceites, azufre y cúpricos.

ADVERTENCIAS:

La información entregada en esta ficha técnica es el resultado de rigurosos estudios que respaldan la composición, estabilidad y efectividad del producto. No obstante, al momento de la utilización en campo, hay una serie de variables adicionales que dependen principalmente del agricultor, de las características propias del huerto, de las condiciones climáticas de la localidad, entre otras.

Dado esto, es deber del usuario observar y asumir toda la información de esta ficha técnica, y así evitar posibles daños por falta de eficacia, toxicidad general, manchas por depósitos, residuos, etc.

PRECAUCIONES:

Almacenar el producto en lugar seco y fresco a temperaturas inferiores a 35°C. Mantener fuera del alcance de los niños, lejos de alimentos, bebidas y piensos.

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR:

BIOAMERICA S.A.
Longitudinal Sur Km 50, Huerto 6 Lote B-2, Paine, Santiago - Chile
info@bioamerica.cl - www.bioamerica.cl

N° DE LOTE:

FECHA DE FABRICACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

