

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Este producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Dinitroanilinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta. No deje solo al intoxicado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua por lo menos por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte
- Antídoto: No tienen antídoto específico
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA  
CICOTOX: 0800-13040; INFOSALUD: 0800-10-828; CISPROQUIM: 080-050847, ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A.: (01) 641-0000

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para plantas acuáticas y semi-acuáticas
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El aplicador debe emplear todas las medidas para controlar la deriva.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



# Exodo

## 400 EC

### PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

### CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Pendimethalin .....400 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 1129 - SENASA

Titular del Registro,  
Importador y Distribuidor:  
**ADAMA Agriculture Perú S.A.**  
Av. El Derby N° 254 Of 503.  
Santiago de Surco. Lima - Perú.  
Teléfono: (01) 641-0000

Formulado por:  
**ADAMA Andina B.V.**  
**Sucursal Colombia**  
Calle 1 C N° 7-53 Int, Zona Franca  
Barranquilla, Colombia.

Contenido Neto: **200 Litros**

Lote No.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:



NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Exodo 400 EC es un herbicida pre-emergente recomendado para el control de malezas anuales de hoja ancha y angosta que se absorbe por las raíces y brotes. Las plántulas emergidas presentan síntomas similares a deficiencia nutricional (enrojecimiento) o de sequía debido al pobre desarrollo del sistema radicular. La pendimethalin actúa inhibiendo la mitosis y división celular en la planta.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| CULTIVO   | MALEZAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DOSIS<br>(L/ha) | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| ALCACHOFA | Amor seco ( <i>Bidens pilosa</i> ), Yuyo ( <i>Amaranthus hybridus</i> ), Hierba mora ( <i>Solanum nigrum</i> ), Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ), capulí cimarrón ( <i>Nicandra physalodes</i> ), Pata de gallina ( <i>Eleusine indica</i> ), Rabo de zorro ( <i>Setaria verticillata</i> )            | 2-3             | 90           | 0.1          |
| ARROZ     | Amor seco ( <i>Bidens pilosa</i> ), Correhuela ( <i>Convolvulus arvensis</i> ), Grama dulce ( <i>Cynodon dactylon</i> ), Malva ( <i>Malvastrum coromandelianum</i> )                                                                                                                                          | 3.0-3.5         | 180          | 0.1          |
| CEBOLLA   | Amor seco ( <i>Bidens pilosa</i> ), Yuyo ( <i>Amaranthus hybridus</i> ), Hierba mora ( <i>Solanum nigrum</i> ), Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ), Malva ( <i>Malvastrum coromandelianum</i> ), Hierba gallinazo o paico ( <i>Chenopodium ambrosioides</i> ), Pega-pega ( <i>Setaria verticillata</i> ) | 2.5-3.0         | 60           | 0.1          |
| ESPÁRRAGO | Amor seco ( <i>Bidens pilosa</i> ), Yuyo ( <i>Amaranthus hybridus</i> ), Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ), Chamico ( <i>Datura stramonium</i> ), Pata de gallina ( <i>Eleusine indica</i> ), Hierba gallinazo ( <i>Chenopodium murale</i> ), Pega-pega ( <i>Setaria verticillata</i> )                 | 2.0             | 14           | 0.15         |
| PIMIENTO  | Capulí cimarrón ( <i>Nicandra physalodes</i> ), Yuyo ( <i>Amaranthus hybridus</i> ), Amor seco ( <i>Bidens pilosa</i> ), Pega-pega ( <i>Setaria verticillata</i> )                                                                                                                                            | 2.0             | 70           | 0.1          |

P.C.: Período de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN,

Número máximo de aplicaciones por campaña-año: 1.

**Alcachofa:** Realizar la aplicación en pre-emergencia de las malezas, 1 a 2 días antes del transplante.

**Arroz:** Realizar la aplicación en pre-emergencia de las malezas, luego de la germinación del cultivo (10 -12 días después de la siembra).

**Cebolla:** Aplicar en pre-emergencia de las malezas, dos días después del transplante del cultivo.

**Espárrago:** Aplicar en pre-emergencia de las malezas, antes del transplante del cultivo o a término de la cosecha.

**Pimiento:** Aplicar antes del transplante, o después de los 7 a 10 días del cambio de surco sobre la línea de riego.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

El pendimethalin es compatible con otros herbicidas residuales como metribuzina, atrazina y oxyfluorfen, sin embargo se recomienda bajo responsabilidad del usuario, realizar pruebas previas a pequeña escala para determinar la compatibilidad física y fitocompatibilidad de la mezcla a usar. No es compatible con sustancias alcalinas.

FITOTOXICIDAD

Exodo 400 EC aplicado bajo las condiciones y dosis recomendadas no presenta riesgo de fitotoxicidad al cultivo.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Dimensiones: 330 mm x 200 mm