

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Prochloraz	450 g/L
Aditivos	c.s.p.1Litro

Req. PQUA N° 1376 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
 Av. El Derby N° 254 Of 503,
 Santiago de Surco, Lima - Perú.
 Teléfono: 641-0000

Formulado por:
ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia
Calle 1 C N° 7-53 Int Zona Franca
Barranguilla, Colombia.

Contenido neto: **5 Litros**
 Lote No.
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



Cara

Dimensiones: 150 mm x 140 mm (por lado)
Nota: Esta etiqueta requiere Hoja Informativa

"LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es dañino, no ingerir.
- Este producto se inhala. Evite respirar el vapor o aspersión.
- Causa irritación a los ojos.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo y la aplicación y lavar y enjuagar la área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Imidazoles
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no inducir al vómito. Lávese la boca con abundante agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. Acuda a un médico.
 - En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco, mantener al paciente recostado y abrigado. Si la respiración es dificultosa darle oxígeno. Si no hay respiración, realizar respiración artificial. Acuda a un médico inmediatamente.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con chorros de agua manteniendo el ojo bien abierto. Consulte con un oftalmólogo.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada, lavar la zona expuesta con jabón suave y agua, a continuación enjuague con agua tibia. Acuda a un médico inmediatamente.
 - Nota al médico: Se desconoce antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de complementaria.
- Teléfono de emergencia: CICOTOX: (01) 328-7700; ESSALUD: (01) 411-8000 opción 4; INFOSALUD: 0800-10-828**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- ### **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para organismos acuáticos.
 - No contaminar lagos, ríos, estanques y drenajes con los desechos y envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
 - En caso de derrame,, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Chronos 45 EC es un fungicida de amplio espectro de control, preventivo y curativo que actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol en los hongos. Por su acción de contacto y movimiento traslaminar se mantiene en la superficie de la hoja protegiéndola y a la vez penetra en el tejido foliar moviéndose hacia el envés de la hoja.

Aplicar al follaje con equipo de pulverización terrestre utilizando un volumen de agua que asegure una buena cobertura de las plantas. Realizar la aplicación con gotas finas y cobertura uniforme. Esperar que el rocío se seque antes de realizar la aplicación para no diluir el producto y disminuir la concentración aplicada.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (mL/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Mango	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	200*	1	5
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	300	14	5
Tomate	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	70 - 90	14	0.5

P.C.: Periodo de Carenia LMR : Límite Máximo de Residuos
*Utilizar un volumen máximo de agua de aplicación de 1000 L/ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar como máximo 01 aplicación por campaña en los cultivo de mango y palto, y 02 aplicaciones por campaña/año en el cultivo de tomate. Realizar la primera aplicación a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad o de forma preventiva cuando las condiciones ambientales favorezcan la aparición de la misma.

Mango..- Realizar una sola aplicación preferentemente en pre-floración o en fructificación (formación de fruto). No aplicar en floración para evitar el riesgo de caída de flores.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 12 horas después de la aplicación.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Contracara

Dimensiones: 150 mm x 140 mm (por lado)
Nota: Esta etiqueta requiere Hoja Informativa