



10.7 cm

LPE0029-001



AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICION:
Bacillus amyloliquefaciens (Cepa QST 713)..... 1,34 %
Aditivos esp..... 100%

*** Contiene un mínimo de 1 x10⁹ CFU/g**

Registro PBUA N° 090-SENASA

FORMULADO POR:
Bayer de México, S.A. de C.V.
Autopista San Martín Texmelucan Tlaxcala,
Km 4.5, Col. San Felipe Itascaclilla,
Itascaclilla de Mariano Matamoros,
Tlaxcala C.P. 90120, México.

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
BAYER S.A.
Av. Paseo de la República 3074
San Isidro, Lima-Perú
Tel.: (01) 2113800

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO
NO INFLAMABLE

Contenido
Neto: 4 Litros

® = Marca Registrada del grupo Bayer

PRECAUCION

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

Use equipo de protección adecuado. Se recomienda el uso de mascarilla o carilla, anteojos protectores, camisa manga larga y pantalón largo, guantes y botas de hule. No comer, beber ni fumar durante el manejo y aplicación de este producto. No mantener este producto en casa de habitación. No se almacene ni se transporte junto con productos alimenticios, ropa o forraje. Almacenar en lugar fresco, seco y a la sombra. Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Después de la aplicación, báñese y cámbiese de ropa.

PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y muéstrela una copia de esta etiqueta. Síntomas de intoxicación: cefalea, somnolencia, vértigo, sofocación, náuseas, vómitos e irritación de mucosas. Dar de beber un vaso de agua en sorbos, si puede tragar. No induzca el vómito. No dar de beber nada a un paciente inconsciente. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 a 20 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

NOTA AL MÉDICO:
Trátese sintomáticamente.

GENERALIDADES: SERENADE ASO es un biofungicida que protege los cultivos contra enfermedades fungosas y bacteriales. SERENADE ASO contiene la cepa patentada QST 713 de la bacteria Bacillus amyloliquefaciens, que brinda una acción antimicrobial superior comparado con cepas comunes de B. subtilis. SERENADE ASO actúa creando inicialmente una zona de inhibición en la hoja, previniendo la instalación del patógeno y destruyendo finalmente el tubo germinativo y micelio del patógeno.

INDICACIONES DE USO: SERENADE ASO se aplica en pulverizaciones previa mezcla con agua, utilizando equipos de aspersión terrestres. Para su preparación verter la dosis recomendada en la mitad del total de agua a utilizar, agitar bien y completar el resto de agua.

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	L/cil. 200L	L/Ha		
HOLANTAO	“Oidium”	Erysiphe polygoni	1 - 1.5	--	N.A.	N.A.
VID	“Oidium”	Erysiphe necator	1 - 1.5	--	N.A.	N.A.
MANGO	“Oidium”	Oidium mangiferae	1 - 1.5	--	N.A.	N.A.
PAPRIKA	“Oidium” “Podrición gris”	Leveillula taurica Botrytis cinerea	1 - 1.5	--	N.A.	N.A.
ESPARRAGO	“Mancha Púrpura”	Stemphylium vesicarium	1 - 1.5	--	N.A.	N.A.
ALCACHOFA	“Podrición gris” “Oidium”	Botrytis cinerea Leveillula taurica	1 - 1.5	--	N.A.	N.A.
CEBOLLA	“Mildiu”	Peronospora destructor	1 - 1.5	--	N.A.	N.A.
MANDARINO	“Podrición gris”	Botrytis cinerea	1 - 1.5	--	N.A.	N.A.
FRESA	“Podrición gris”	Botrytis cinerea	1 - 1.2	--	N.A.	N.A.
TOMATE	“Podrición gris”	Botrytis cinerea	1 - 1.2	--	N.A.	N.A.
BANANO	“Sigatoka negra”	Mycosphaerella fijiensis	1.5 - 2	--	N.A.	N.A.
PALTO	“Podrición gris”	Botrytis cinerea	1.2 - 1.5	--	N.A.	N.A.
ARANDANOS	“Podrición gris”	Botrytis cinerea	2	--	N.A.	N.A.
CAFÉ	“Roya”	Hemileia vastatrix	1.5	--	N.A.	N.A.
ARROZ	“Añublo bacterial de la panícula”	Burkholderia glumae	1.5	--	N.A.	N.A.
QUINUA	“Mildiu”	Peronospora farinosa	1.5	--	N.A.	N.A.
VID	“Podrición ácida”	Penicillium sp., Aspergillus sp., Rhizopus sp.	1.5	--	N.A.	N.A.
PAPA	“Rhizoctonia”	Rhizoctonia solani	1.5	1.875	N.A.	N.A.
LECHUGA	“Fusarium”	Fusarium oxysporum	1.5	1.8 - 2.25	N.A.	N.A.

N.A.=No aplica, PC= Periodo de carencia. No hay restricciones.
L.M.R.=Límite máximo de residuos. Está exento de tolerancia de residuos en todos los cultivos agrícolas

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: se recomienda efectuar las aplicaciones de manera preventiva antes de que se presenten síntomas evidentes de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean favorables para la presencia del patógeno.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con todos los plaguicidas, fertilizantes foliares y bioestimulantes. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No se ha reportado fitotoxicidad cuando se usa siguiendo las recomendaciones de dosis y época de aplicación; sin embargo, se deben realizar pruebas de fitocompatibilidad en los cultivos recomendados ya que cada variedad puede reaccionar de manera diferente.

TOXICOLOGÍA:
DL50 Oral y Dermal aguda: > 5000 mg/kg

ANTIDOTO:
No hay un antidoto específico. El tratamiento es sintomático.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
“El Titular del registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las características físico-químicas indicadas en la etiqueta, y es eficaz para los fines que recomienda, siempre y cuando se sigan las instrucciones dadas”.

Lote N°:

F. de Formulación:

F. de Vencimiento:

NO IMPRIME
Área reservada de brillo

ZONA DE PEGA

