

Altura Total 13.5 cm.

Longitud Total 28.9 cm.

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Evite el contacto con el producto.
- Conservar el producto en un lugar sombreado, fresco y seco, bajo llave en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer o beber durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de inhalación, lleve a la persona al aire fresco. Si la respiración es deficiente brinde respiración artificial. Procure atención médica si fuese dificultoso.
- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consiga atención médica.
- En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste acuda a atención médica.
- En caso de ingestión no inducir el vómito ni administre nada a una persona inconsciente. Si es necesario consiga atención médica.
- No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

TÉLFONOS DE EMERGENCIA: SAMU:106;

ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua.
- No tiene efecto negativo sobre la fauna benéfica y/o silvestre.
- No contaminar con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes de productos o envases vacíos.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



Reg. PBA-EV N° XXX-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.
Av. El Derby N° 254, Int. 306, Santiago de Surco.
Lima - Perú. Telf: (01) 641-0000

Formulado por:
Ingeniería Industrial S.A de CV
Carretera Tecuaititlan km 0.676, colonia, San miguel
de Zapotitlan, Poncitlan Jalisco,
CP 45977. México.

Contenido Neto: **1 Litro**

Lote N°:
Fecha de Producción:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

Bralic[®] 1.8 ME

EXTRACTO VEGETAL

INSECTICIDA AGRÍCOLA

MICROEMULSIÓN (ME)

COMPOSICIÓN:
Aceite esencial de ajo 17.92 g/L
(equivalente a 6.27 g/L Allyl disulfide)
Aditivos..... csp 1L

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BRALIC[®] 1.8 ME es un insecticida biológico basado en extracto de ajo. El cual posee acción disuasora en los hábitos alimenticios de insectos y plaga y obstruye la acción de las feromonas naturales causando desorientación a los insectos en su etapa de reproducción. Compuesto principalmente por diversos sulfuros de dialilo, utilizado como disuasivo para insectos.

El producto se emplea mediante aspersión foliar con pulverizadoras terrestres de uso corriente, boquilla cono abierto.

Modo de preparación: llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de **BRALIC[®] 1.8 ME**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante.

Se recomienda antes de iniciar la aplicación verificar que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado. La aplicación debe asegurar una buena cobertura del follaje y frutos sin llegar al escurrimiento.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ARÁNDANO	"Chanchito blanco"	<i>Planococcus citri</i>	2.0	N.A.	N.A.
VID					

P.C: Período de carencia L.M.R: Límite máximo de residuos NA: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

-Se recomienda aplicar **BRALIC[®] 1.8 ME**, hasta dos (02) aplicaciones por campaña, considerando una (01) campaña por año para arándano y vid. Asimismo, considerar un intervalo mínimo entre aplicaciones de 7 días.

-Aplicar cuando se presenten los primeros síntomas o cuando las condiciones climáticas favorezcan el incremento de la enfermedad.

-Realizar las aplicaciones del **BRALIC[®] 1.8 ME**, desde etapa de floración - cuajado hasta maduración de la baya, ya que es la etapa más susceptible al ingreso de la plaga al racimo.

PERIODO DE REINGRESO:

No aplica por ser un producto biológico.

COMPATIBILIDAD:

Incompatibles con materiales alcalinos fuertes, materiales ácidos fuertes y oxidante fuerte.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones."



PRECAUCIÓN



Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.

09 cm