

Cupravit®

Fungicida / Polvo humectable

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Ingrediente activo:

OXICLORURO DE COBRE

Composición porcentual:

Ingrediente activo:	% en peso
Oxicloruro de cobre: NO MENOS DE:	85.0
(Equivalente a 500 g de i.a./kg)	
Ingredientes inertes:	
Dluyente, humectante, dispersante y compuestos relacionados. NO MÁS DE:	15.0
TOTAL	100.0

Categoría toxicológica:

5 Precaución

No. de Registro:

RACO-FUNG-0328-003-002-085

Sistemicidad:

Sistémico	Contacto	Translaminar
	X	

Descripción:

Fungicida de aplicación preventiva y acción por contacto que controla las principales enfermedades fungosas en cultivos de gramíneas, solanáceas, cítricos, crucíferas, cucurbitáceas, leguminosas, frutales, espinaca, lechuga, fresa, cacao, cafeto, nogal, tabaco, espárrago, cempasúchil, vainilla y vid, complementando eficazmente los programas de alternancia con fungicidas sistémicos.

USOS

Cultivo	Enfermedades	Dosis	Cultivo	Enfermedades	Dosis
Ajonjolí	Mancha de las hojas, Vainas: <i>Alternaria sesami</i>	2 a 4 kg/ha	Aguacatero	Mancha de chapopote: <i>Phyllachora</i> sp; manchas foliares: <i>Cercospora</i> sp y <i>Pestalotia</i> sp; antracnosis: <i>Colletotrichum</i> sp y <i>Cladosporium</i> sp; roña: <i>Sphaceloma</i> sp; pudrición del fruto: <i>Monilia</i> sp y <i>Diplodia</i> sp, y algas: <i>Cephaleuros</i> sp.	*300 a 400 g /100 L de agua
Alfalfa	Mildiú vellosa: <i>Peronospora trifoliorum</i> , Peca: <i>Pseudopeziza medicaginis</i>		Cacao	Pudrición negra: <i>Phytophthora palmivora</i> ; moho de hilachas: <i>Corticium koleroga</i> ; mal rosado: <i>Corticium salmonicolor</i> ; antracnosis: <i>Colletotrichum gloesporioides</i> , y algas: <i>Cephaleuros</i> sp.	

Apio	Tizón temprano o Mancha foliar: <i>Cercospora apii</i> ; Tizón tardío: <i>Septoria apii</i> , Manchas foliares y del tallo: <i>Septoria apii</i> .	2 a 4 kg/ha	Cafeto	Moho de hilachas: <i>Corticium koleroga</i> ; ojo de gallo: <i>Mycena citricolor</i> ; mal rosado: <i>Corticium salmonicolor</i> ; mancha de hierro: <i>Cercospora coffeicola</i> , y roya: <i>Hermileia vastatrix</i> .	*300 a 400 g /100 L de agua
Berenjena	Tizón del follaje y fruto: <i>Alternaria</i> sp; antracnosis: <i>Colletotrichum</i> sp., Fumagina: <i>Capnodium</i> sp.		Ciruelo	Pudrición morena: <i>Monilinia fruticola</i>	
Cacahuete	Mancha café de las hojas: <i>Cercospora arachidicola</i>		Lima Limonero, naranjo y toronjo	Antracnosis: <i>Colletotrichum gloesporioides</i> ; pudrición del fruto: <i>Botrytis</i> sp; melanosis: <i>Diaporthe citri</i> ; pudrición negra del fruto: <i>Alternaria citri</i> ; roña: <i>Elsinoe fawcetti</i> ; gomosis: <i>Phytophthora</i> sp; fumagina: <i>Capnodium citri</i> , y mancha bacteriana: <i>Xanthomonas</i> sp.	
Cebolla y ajo	Mancha púrpura: <i>Alternaria porri</i> , Mildiú veloso: <i>Peronospora destructor</i>		Durazno	Viruela o roya: <i>tranzschella</i> sp; verrucosis: <i>Taphrina deformans</i> ; Tiro de munición: <i>Ciadosporium carpophilum</i> , Mancha del fruto y de la hoja: <i>Alternaria</i> sp.	
Cempasúchil	Tizón o mancha foliar: <i>Alternaria</i> sp.		Guayabo	Antracnosis: <i>Colletotrichum gloesporioides</i> , Clavo: <i>Gloeosporium psidi</i> .	
Brócoli, col, coliflor y col de bruselas	Mildiú veloso: <i>Peronospora parasitica</i> , Mancha negra: <i>Alternaria brassicae</i> , y mancha de anillo: <i>Mycosphaerella brassicicola</i> .		Mango	Antracnosis: <i>Colletotrichum gloesporioides</i> ; Manchas de las hojas y frutos: <i>Elsinoe mangiferae</i> ; moho de las hilachas: <i>Corticium koleroga</i> ; Fumagina: <i>Capnodium</i> sp, Mancha de troncos y ramas: <i>Líquenes</i> .	
Calabacita, calabaza, melón, pepino y sandía	Mildiú veloso: <i>Pseudoperonospora cubensis</i> , Antracnosis: <i>Colletotrichum lagenarium</i> , Mancha de la hoja: <i>Alternaria cucurbitina</i> .		Manzano y peral	Pudriciones negra y amarga: <i>Phytophthora captorum</i> ; Roña: <i>Elsinoe pyri</i> ; Mancha de la hoja: <i>Alternaria</i> sp y <i>Cercospora</i> sp; Cáncer del tronco: <i>Nectria galligena</i> , y Tizón de fuego: <i>Erwinia amylovora</i> .	
Chícharo	Antracnosis: <i>Colletotrichum</i> sp., Tizón: <i>Ascochyta pisi</i> .		Nogal	Antracnosis: <i>Colletotrichum</i> sp; Tizón de hojas y frutos: <i>Alternaria</i> sp, y Mancha de café: <i>Cercospora fusca</i> .	
Chile	Tizón temprano: <i>Alternaria solani</i> ; Tizón tardío: <i>Phytophthora infestans</i> ; Mancha foliar: <i>Cercospora capsici</i> ; Antracnosis: <i>Colletotrichum</i> sp., Mancha bacteriana: <i>Xanthomonas versicatoria</i> .		Papayo	Antracnosis: <i>Colletotrichum gloesporioides</i> .	
Espinaca y lechuga	Mildiú veloso: <i>Bremia lactucae</i> , Mancha del follaje: <i>Alternaria</i> sp.		Plátano	Chamusco: <i>Mycosphaerella musicola</i> ; Manchas del fruto: <i>Macrophoma musae</i> , y Antracnosis: <i>Colletotrichum</i> sp.	

Productos Fitosanitarios

Fresa	Pudrición gris del fruto: <i>Botrytis cinerea</i> ; Manchas foliares: <i>Alternaria sp</i> y <i>Cercospora sp</i> , Ojo de pájaro: <i>Mycosphaerella sp</i> ; Pudrición de frutos y flores: <i>Botrytis cinerea</i> , Mancha angular: <i>Xanthomonas fragariae</i> .	2 a 4 kg/ha	Vainilla	Manchas del follaje: <i>Alternaria sp</i>	*300 a 400 g /100 L de agua
Frijol y frijol ejotero	Chahuixtle: <i>Uromyces phaseoli</i> ; Antracnosis: <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> ; Mancha de hojas y vaina: <i>Sphaeosisariopsis griselloa</i> , y Tizón común: <i>Xanthomonas phaseoli</i> .		Vid	Antracnosis: <i>Colletotrichum sp</i> y <i>Sphacetoma sp</i> ; Mildiú veloso: <i>Plasmopara viticola</i> , y Pudrición negra: <i>Gignardia bidwelli</i> .	
Papa	Tizón temprano: <i>Alternaria solani</i> , Tizón tardío: <i>Phytophthora infestans</i> , Mancha de la hoja: <i>Stemphylium solani</i> .				
Espárrago	Tizón del follaje: <i>Alternaria sp</i> .				
Tabaco	Tizón temprano: <i>Alternaria sp</i> ; Tizón tardío: <i>Phytophthora infestans</i> , Ojo de la rana: <i>Cercospora nicotianae</i> .				
Jitomate y tomate de cáscara	Tizón temprano: <i>Alternaria solani</i> ; Tizón tardío: <i>Phytophthora infestans</i> , Mancha gris: <i>Stemphylium sp.</i> , Moho de la hoja: <i>Cladosporium fulvum</i> ; Pudrición del fruto: <i>Colletotrichum sp.</i> , Mancha bacterial: <i>Xanthomonas versicatoria</i> .				

El tiempo de reentrada a las zonas tratadas es de 12 horas.

*Para el manejo de esta concentración debe considerarse un volumen mínimo de 1000 L de agua/ha.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 Kg