BASF

We create chemistry

Regalis™

Fitorregulador
Granulado dispersable (WG)
Fitorregulador recomendado para disminuir el desarrollo vegetativo en manzanos, perales y cerezos.

Composición
Prohexadiona-calcio *.....10 % p/p (100 g/Kg)
Coformulates, c.s.p..... 100 % p/p (1 Kg)
***3-óxido-5-oxo-4-propionilciclohex-3-enocarboxilato de calcio

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 4182
NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

Lote:
Vencimiento:

USO EXCLUSIVO SAG

Contenido neto: 1 Kilo

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y FOLLETO ADJUNTO) ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por:
BASF S E
D- 67056 Ludwigshafen, Alemania
IPT Pergande GmbH
Wilfried Pergande Platz 1,
06369 WeiBsanBandt-Gölzau, Alemania

Importado y Distribuido por
BASF Chile S.A.
Carrascal 3851 - Casilla 3238
Fono: (56) 22640 7000
Santiago - Chile
Representante en Chile de BASF S E

TM = Marca Comercial de BASF

CUIDADO

Regalis®

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Prohexadiona-calcio pertenece al grupo químico de los ciclohexanodionas.
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar seco, bien ventilado, fresco, libre de heladas, evitando temperaturas sobre 40º C.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar guantes de goma, botas de goma, delantal impermeable, protector facial. Durante la aplicación usar guantes de goma, botas de goma, overol impermeable, protector facial.
- Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separa-damente de la ropa doméstica
- Lavarse prolijamente con agua antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.

Síntomas de intoxicación: No se conocen síntomas específicos de intoxicación.

Primeros auxilios

- **Contacto con los ojos:** lávelos inmediatamente con agua corriente por 10 a 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Si ocurre irritación, consultar la médico.
- **Contacto con la piel:** retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Si ocurre irritación, consultar al médico.
- **Inhalación:** llevar a la persona al aire fresco. Mantener a la persona en reposo. Procurar asistencia médica.
- **Ingestión:** enjuagar la boca y luego beber agua en abundancia. Procurar asistencia médica a la brevedad para tratamiento inmediato. El vómito sólo debe ser inducido bajo supervisión médica.

USO EXCLUSIVO SAG

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 / 2016 - M.E.S **JUN '2016 -5**

ABRA AQUI - Instrucciones de Uso al Reverso

CUIDADO

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático y de sostén.

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Riesgos ambientales: Regalis™, en condiciones normales de uso, es considerado prácticamente no tóxico para peces, aves y abejas.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS". "EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD". "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL". "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA". "NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO". LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE". "REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES".

Procedimiento para el triple lavado:

1. Una vez vacío el envase, agregar agua hasta 1/4 de la capacidad del envase; cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces.
2. Perfore el envase para evitar su reutilización.

USO EXCLUSIVO SAG

Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.: (56) 22 640 7000
CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56) 22 635 3800 **(Atención las 24 horas)**
CITUC Químico (Emergencia química): (56) 22 247 3600

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

CUIDADO

Regalis®

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

GENERALIDADES: Regalis™ actúa como un fitorregulador de crecimiento para inhibir o disminuir el crecimiento vegetativo y optimizar el rendimiento y calidad de frutos en manzanos , perales y cerezos.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo	Objetivo	Dosis	Aplicación
Manzano	Disminuir el desarrollo vegetativo	125 g/ 100 L agua	1ª aplicación: con brotes terminales de 10 cm de largo. 2ª aplicación: 30 a 40 días después de la primera. Aplicar con nebulizadora.
Peral		200 g/ 100 L agua	1ª aplicación: en inicio de caída de pétalos. 2ª aplicación: 30 a 40 días después de la primera. Aplicar con nebulizadora.
Cerezo		200 g/ 100 L agua	Realizar una aplicación: 5-10 cm de crecimiento de los brotes. En huertos muy vigorosos, realizar una segunda aplicación en postcosecha (Diciembre). Aplicar con nebulizadora.

Volumen de agua recomendado: 1.000 L/ha para árboles de 4 a 4,5 m de altura. Ajustar el volumen de agua para árboles de mayor o menor altura. **Recomendaciones para la aplicación:** Ajustar el pH del agua entre 4 y 5 antes de preparar la mezcla. Consultar con nuestro Departamento Técnico para recomendación específica. Aplicar en condiciones de alta humedad relativa (evitar aplicar en horas de calor) para favorecer un secado lento. **Preparación de la mezcla:** Mezclar la cantidad necesaria de **Regalis**™ en un poco de agua formando una pasta. Luego agregarla al estanque de la nebulizadora a medio llenar con agua con el sistema de agitación funcionando y completar hasta volumen total, manteniendo la agitación durante la aplicación. **Fitotoxicidad: Regalis**™ no presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso de esta etiqueta. Dejar un intervalo de 2 días entre la aplicación de **Regalis**™ y la de algún fitorregulador en base a GA3 o mezclas de GA34 + GA 7. **Compatibilidad: Regalis**™ es compatible con insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares comúnmente utilizados en manzanos, perales y cerezos, sin embargo en caso de mezclas específicas consultar a Nuestro Departamento Técnico. Para favorecer el cubrimiento de la aplicación **Regalis**™ puede ser aplicado en mezcla con Break. **Incompatibilidad:** No mezclar con fitorregulador en base a GA3 o mezclas de GA34 +GA 7. En caso de mezclas específicas, consultar con nuestro Departamento Técnico.**Período de carencia:** Respete carencia de 30 días en manzanos, perales y cerezos. En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país de destino. **Tiempo de reingreso:** No hay restricciones una vez secado el depósito aplicado, 1 hora de espera es suficiente, confirmando previamente el secado completo del depósito aplicado. Tiempo de reingreso para animales, no aplica ya que el producto no está recomendado para cultivos destinados a pastoreo.

Break = marca Registrada de Goldschmidt

Producto INACTIVO SAG

CUIDADO