



Mejora la floración y optimiza el cuajado

Contenido declarado

Nitrógeno (N) total	4,80 % p/p
Nitrógeno (N) orgánico	4,50 % p/p
Aminoácidos.....	24,0 % p/p
Aminograma: Ala (0.22%), Cys(0.042%), Asp (0.39%), Glu (8,06%), Phe (0.13%), Gly (6.10%), His (0.08%), Ile (0.13%), Lys(5.22%), Leu (0.29%), Met (0.071%),Pro (1.94%), Arg (0.51%), Ser (0.62%), Thr (0.40%), Val (0.27%), Tyr (0.07%).	

Características Físico Químicas

Apariencia: líquido

Olor: característico del producto

Color: marrón

Solubilidad: completamente soluble

Densidad (20° C): 1,18 ± 0,05 g/ml

pH (20°C): 7,5 ± 0,5

Propiedades

Kynetic4® es un bioestimulante especialmente diseñado para suministrar a los cultivos moléculas orgánicas que sean intermediarios de las principales rutas metabólicas. De esta manera con Kynetic4 favorecemos la síntesis de proteínas específicas en los momentos de mayor demanda energética de los cultivos. La equilibrada formulación de Kynetic4 aporta aminoácidos específicos capaces de regenerar el estado del cultivo y hacerlo resistente a diversas condiciones de estrés como salinidad, temperaturas extremas, sequía, etc. También aporta materia orgánica y ácidos fúlvicos para favorecer el crecimiento de los cultivos.

Instrucciones específicas de uso

CULTIVOS	DOSIS		RECOMENDACIONES
	Foliar	Fertirrigación	
Hortícolas y Berries	200-400 ml/hl 2-3 l/ha por aplicación	5-15 l/ha (repartidos en las diversas aplicaciones)	Foliar: realizando 2-3 aplicaciones desde el inicio del periodo de floración. Fertirrigada: realizando 3-4 aplicaciones empezando en las fases de pre-floración.
Cítricos, frutos secos y frutales	100-300 ml/hl 2-3 l/ha	15-25 l/ha (repartidos en las diversas aplicaciones)	Cítricos: 1ª aplicación entre el 25-50% de flor abierta; 2ª aplicación entre el 75-85% de flor abierta; 3ª aplicación opcional para asegurar amarre. Frutos secos: 1ª aplicación 25% de flor abierta (botón rosa); 2ª aplicación 75% flor abierta. Frutales: movida de yemas, pre-floración y cuajado.
Vid y uva de mesa	100-200 ml/hl 1,5-2,5 l/ha	10-20 l/ha (repartidos en las diversas aplicaciones)	Foliar: 1ª aplicación en pre-floración; 2ª aplicación caída de capuchones o cuajado. Fertirrigada: A lo largo de todo el ciclo. Realizando 2-4 aplicaciones dentro de los periodos de gran demanda energética.
Olivo	100-300 ml/hl 2-4 l/ha	15-25 l/ha (repartidos en las diversas aplicaciones)	1ª aplicación en pre-floración; 2ª aplicación en caída de pétalos.
Cultivos extensivos e industriales: cereales, arroz, maíz...	1-3 l/ha	5-10 l/ha (repartidos en las diversas aplicaciones)	Realizar la aplicación en las fases de crecimiento.
Potenciador de caldos herbicidas	0,5-1,5 l/ha	--	Utilizar en mezcla con los herbicidas de post-emergencia en una sola aplicación

Certificaciones

Certificado ecológico por CAEE según RCE 834/2007

Presentación



Las especificaciones técnicas del producto, tales como riquezas garantizadas, propiedades, dosis y modo de empleo, aplicaciones y cultivos, registro, precauciones, normas de almacenamiento, incompatibilidades y notas del fabricante van reflejadas en la etiqueta del producto.



www.seipasa.com • consulta@seipasa.com

Fábrica: C/ Ciudad Dario, naves 1-3-5. Pol. Ind. La Creu • 46250 L'Alcudia (Valencia) Spain • Tel. +34 962 541 163 Fax. +34 962 541 633

Headquarters: C/ Almudévar, 2 • 22240 Tardienta (Huesca) Spain • Tel. +34 974 253 433 • Fax +34 974 253 298

Filial México: C/ Río Humaya, 288 • Pte. Col. Guadalupe • Culiacán, Sinaloa 80220 • Tel. (52-667) 174 02 33