

Advance Magnésio

FERTILIZANTE FOLIAR CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN	
INGREDIENTES	CONTENIDO
Magnesio (MgO)	10,0 % p/v
Aminoácidos	6,0 % p/v
Trehalosa	2,0 % p/v

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS	
PARÁMETRO	VALOR
Solubilidad en agua a 20 °C	> 99 %
pH	5,7
Densidad a 20 °C	1.200 g/L

Metales pesados: Pb < 2,0 ppm; As < 2,0 ppm; Cd < 2,0 ppm; Hg < 2,0 ppm

DOSIS Y APLICACIÓN			
CULTIVO	DOSIS/100 L	DOSIS/ha	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Arándanos y Berries	200 - 300 mL	2 - 4 L	Durante crecimiento de frutos y brotes, postcosecha
Cerezos, Ciruelos, Nectarines, Duraznos, Damascos y Almendros	200 - 300 mL	2 - 4 L	Durante crecimiento de frutos y brotes, postcosecha
Cítricos	200 - 300 mL	2 - 4 L	En peaks de crecimiento vegetativo
Espárragos	100 - 200 mL	2 - 3 L	Durante todo el crecimiento vegetativo, repetir cada 10 o 15 días
Hortalizas de hoja verde	100 - 200 mL	2 - 3 L	A partir de dos hojas verdaderas, repetir cada 7 días
Nogal y Avellano europeo	200 - 300 mL	2 - 4 L	Durante crecimiento de frutos y brotes, postcosecha
Palto	200 - 300 mL	2 - 4 L	En peaks de crecimiento vegetativo.
Olivo	200 - 300 mL	2 - 4 L	En oración de racimo floral
Pomáceas	200 - 300 mL	2 - 4 L	Durante crecimiento de frutos y brotes, postcosecha
Papas	200 - 300 mL	2 - 3 L	Desde 20 días post emergencia, repetir cada 15 días
Tomate, pimentón, ají	100 - 200 mL	2 - 3 L	Desde 15 días post trasplante, repetir cada 7 o 15 días
Vid de mesa	200 - 300 mL	2 - 4 L	Desde brotación, cada 7 días, inicio crecimiento bayas. Postcosecha
Vid vinífera	200 - 300 mL	2 - 4 L	Desde brotación, cada 7 días, inicio crecimiento bayas. Postcosecha
Kiwi	200 - 300 mL	2 - 4 L	Desde brotación, repetir cada 7 días
Viveros Frutales	100 - 200 mL	2 - 4 L	Cada 10 días a partir de brotes de 10 cm

Advertencia: Lea cuidadosamente la etiqueta y la ficha técnica del producto previo a su uso. El uso adecuado del producto y de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta y la ficha técnica no debiese afectar negativamente el crecimiento vegetativo-reproductivo normal, en la mayoría de las situaciones. Sin embargo, diversos factores medioambientales y agronómicos, como el estrés de los cultivos asociados a las altas y bajas temperaturas y/o condiciones secas o excesiva humedad, hacen que sea imposible eliminar todos los riesgos asociados al uso del producto, por lo que el daño al cultivo siempre es posible. Atendida la diversidad de factores que pueden incidir en el cultivo, el cliente siempre deberá aplicar el producto siguiendo las recomendaciones de una institución o persona calificada, tales como pero no limitado a, asesores de cultivos certificados, ingenieros agrónomos o recomendaciones aprobadas en el plan de manejo de nutrientes. En caso de dudas, consulte previamente a su representante del Distribuidor del producto. El cliente es responsable de la conservación, manipulación y utilización adecuada del producto. El incumplimiento de las instrucciones de conservación, manipulación, utilización y, en general, toda aquella información contenida en la etiqueta y ficha técnica del producto, pueden causar daños a los cultivos, animales, el hombre o el medioambiente, no siendo de responsabilidad de Agroadvance® SpA o el vendedor las consecuencias del uso inadecuado del producto en las condiciones señaladas.

Fertilizante foliar corrector de deficiencias fisiológicas de Magnesio.

Recomendaciones de uso:

- Llene el equipo pulverizador con agua a 2/3 de su capacidad.
- Agite y disuelva el producto Advance Magnesio.
- Complete con agua al volumen requerido. Una vez preparada la solución aplique inmediatamente al cultivo.
- Aplique con un volumen suficiente de agua que permita asperjar copa y frutos, idealmente con nebulizador. Considere utilizar boquillas de cono lleno con tamaño de gota entre 120 y 160 micrones. En el caso de hortalizas mediante barra.
- Evite las horas de temperaturas extremas (bajo 2 °C o sobre los 25 °C) y/o días con humedad relativa alta o donde ha ocurrido helada, por la sensibilidad de la epidermis del fruto.
- No olvide tomar las debidas medidas de seguridad para cada aplicación foliar.

Duración: Por un periodo de 24 meses, a partir de la fecha de elaboración. Conservar en un ambiente fresco y seco hasta su uso. Una vez abierto, es necesario utilizar el producto en su totalidad dentro de las primeras 72 hrs. No almacenar los remanentes.

Precauciones: Advance Magnesio no es un producto peligroso pero en contacto con la piel, ingestión o contacto ocular puede provocar efectos nocivos o irritación. Para mayor información consultar hoja de datos de seguridad del producto. En cualquier caso, de intoxicación o efectos adversos, consultar a un médico o contactar a Corporación RITA +562 2777 1994.

Compatibilidad: No mezclar con productos de reacción alcalina, derivados cúpricos y aceites minerales. Se recomienda realizar previamente pruebas de reactividad antes de su aplicación. En caso de aplicarlo con productos diferentes a los señalados, consultar previamente su compatibilidad con un asesor experto o al representante del Distribuidor del producto.

Fitotoxicidad: No presenta, si se aplica según recomendación de la etiqueta y ficha técnica.



No use el producto en forma diferente a lo indicado en esta etiqueta y la ficha técnica.



**AGRO
ADVANCE®**
BIOTECNOLOGÍA

Producto fabricado por **Agroadvance SpA.**
C Camino Melipilla 26.200, Peñaflor.
Fono: +56 2 270 85 377 | www.agroadvance.cl

