

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evite el contacto con el producto y la formación de vapores/aerosoles .
- Conservar el producto en un lugar sombreado, fresco y seco, bajo llave en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer o beber durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de inhalación, lleve a la persona al aire fresco. Si la respiración es deficiente brinde respiración artificial. Procure atención médica si fuese dificultoso.
- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consiga atención médica.
- En caso de contacto con la piel, lave con abundate agua y jabón. Si la irritación persiste acuda a atención médica.
- En caso de ingestión no inducir el vómito ni administre nada a una persona inconsciente. Si es necesario consiga atención médica.
- No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU:106;
ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua.
- No tiene efecto negativo sobre la fauna benéfica y/o silvestre.
- No contaminar con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes de productos o envases vacíos.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



ACTAVAN®

EXTRACTO VEGETAL
FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Extracto de remolacha azucarera 900 g/L
(min. 250 g/L TMG)
Aditivos..... csp 1L

Reg. PBA-EV N° 208-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of. 306
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01) 641-0000

Formulador:
Waikaitu Limited
303 Aporo Road, Tasman, Nelson 7173.
New Zealand.
Telf.: +64 3 970 0302

Contenido neto: **20 Litros**

N° de Lote:
Fecha de Producción:
Fecha de Vencimiento:



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ACTAVAN el contenido de Glycine betaine/TMG presente en el producto actúa induciendo el mecanismo de defensa natural de las plantas (elictor), conocido como mecanismo de Resistencia Sistémica Adquirida (SAR) que genera una serie de respuestas genéticas para el control de *Botrytis sp.*

El producto se emplea mediante aspersión foliar con pulverizadoras terrestres de uso corriente, boquilla cono abierto.

Modo de preparación: llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de ACTAVAN, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante.

Se recomienda antes de iniciar la aplicación verificar que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado. La aplicación debe asegurar una buena cobertura del follaje y frutos sin llegar al escurrimiento.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ARÁNDANO	“Podredumbre gris”	<i>Botrytis cinerea</i>	4.0	N.A.	N.A.
VID	“Pudredumbre gris”	<i>Botrytis cinerea</i>	4.0 - 4.5	N.A.	N.A.

P.C: Período de carencia L.M.R: Límite máximo de residuos NA: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

–Se recomienda aplicar ACTAVAN hasta dos (02) aplicaciones por campaña, considerando una (01) campaña por año para arándano y vid. Asimismo, considerar un intervalo mínimo entre aplicaciones de 7 y 10 días, respectivamente.

– Aplicar cuando se presenten los primeros síntomas o cuando las condiciones climáticas favorezcan el incremento de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO

No aplica por ser un producto biológico.

COMPATIBILIDAD

Incompatibles con materiales alcalinos fuertes, materiales ácidos fuertes y oxidante fuerte.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones."



PRECAUCIÓN



Dimensiones: 330 mm x 200 mm