



“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Manejo y disposición de desechos y envases vacíos:
Después de usar el contenido del envase, inutilicelo rompiéndolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. No disponer con residuos municipales.

Medidas para la protección y conservación del ambiente:
Peligroso para organismos acuáticos.
No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Lote Nº:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

UN 3077



FUNGICIDA AGRÍCOLA

Gránulo Dispersable (WG)

Trifloxystrobin, 250 g/kg
Tebuconazole, 500 g/kg
Aditivos, 250 g/kg

Reg. PQUA Nº 193-SENASA

Titular del Registro:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 9, San Isidro

Formulado por:
Bayer CropScience
D-51368
Leverkusen - Alemania

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro, Lima-Perú, Telf: 2113800

¡ NO INFLAMABLE ! ¡ NO CORROSIVO !
¡ NO EXPLOSIVO !

Contenido
Neto: 1 kg

® = Marca Registrada de Bayer AG/Alemania

PE-01/11/2011 80566840A



“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Precauciones: Manipuleo - Almacenaje - Transporte:
No debe transportarse ni almacenarse conjuntamente con productos alimenticios, bebidas, forrajes, medicinas, etc. No se debe comer, beber, ni fumar durante la aplicación. Después de terminada la aplicación deberá cambiarse de ropa y lavarse todas las partes del cuerpo expuestas con abundante agua y jabón. Evítese el contacto con la piel, ojos y ropa. Manéjese en envases originales, almacenándolo herméticamente cerrado en lugares frescos y secos alejado del alcance de los niños, personas irresponsables y animales. No contaminar las fuentes de agua.
Causa irritación moderada a los ojos (usar gafas o protección ocular en la mezcla y aplicación). Es ligeramente irritante a las vías respiratorias. Evitar respirar la aspersión. Ligeramente irritante a la piel.
No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada durante las primeras 12 horas. Usar lentes, máscara, guantes, botas, mameluco o overol completo, gorro.

Primeros Auxilios:
Grupos químicos: Tebuconazole = Triazoles;
Trifloxystrobin = Estrobirulinas
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. Quite la ropa contaminada inmediatamente. Lave las partes contaminadas del cuerpo con agua y jabón. Lave los ojos contaminados con un chorro suave de agua pura por un lapso de 10 a 15 minutos. Mantenga al paciente animado, caliente, al aire fresco y en posición de descanso. Dé soporte respiratorio si es necesario. No induzca al vómito si el paciente está inconsciente.
En caso de intoxicación o contaminación ocular o dermal, lavar con abundante agua y llevar el paciente al médico.

Indicaciones para el médico:
Tratamiento sintomático y de sostén. Mantenga libres las vías respiratorias y si es necesario por medio de respiración controlada.

Antídoto: Tratamiento sintomático.
Teléfonos de emergencia en caso de intoxicación:
CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROQUIM: 0800-50847



GENERALIDADES: Nativo 75 WG es un fungicida sistémico, que posee dos ingredientes activos en la formulación que actúan de manera complementaria. Tebuconazole inhibe la biosíntesis de ergosterol y otros procesos enzimáticos de los hongos, mientras que Trifloxystrobin inhibe la respiración celular de los hongos.

INDICACIONES DE USO: Aplicar al inicio de síntomas de la enfermedad. Se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Es recomendable preparar previa mezcla en un volumen reducido de agua agitando completamente y luego agregar el resto del agua al tanque de aspersión. Se recomiendan 3 aplicaciones por campaña dentro de un programa de manejo integrado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

USO ESPECÍFICO:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		LMR (ppm)	PC (días)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha	%		
VID	Oidiois	<i>Uncinula necator</i>	0.3 - 0.375	0.02 - 0.025	2 **	14
	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	0.375	0.025		
PIMIENTO	Oidiois	<i>Leveillula taurica</i>	0.25	0.05	Trifloxystrobin: 0.3 Tebuconazole: 0.5	N.d
ESPÁRRAGO	Mancha púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.3	--	Trifloxystrobin: 0.02 Tebuconazole: 0.05	N.d
ALCACHOFA	Oidiois	<i>Leveillula taurica</i>	0.3	--	Trifloxystrobin: 0.02 Tebuconazole: 0.5	21
ARROZ	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.2 - 0.25	--	Trifloxystrobin: 0.02 Tebuconazole: 2	21

Vid: Considerar un gasto de agua de 1500 l/ha. Arroz: Considerar un gasto de agua de 180 l/ha.
** Para ambos ingredientes activos. PC = Período de carencia (días). LMR = Límite máximo de residuos (ppm).

PERÍODO DE REENTRADA: 12 horas después de aplicado en el campo.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de productos químicos de uso agrícola, sin embargo es conveniente previo a hacer la mezcla corroborar la compatibilidad entre ambos productos.


FITOTOXICIDAD: Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados siguiendo las indicaciones y dosis establecidas.

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.”

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO





PDF CERTIFICADO	Ref. Caja 1 kilo	Guía Troquel
Producto: Nativo 75 WG	País: PERÚ	
Fecha: Noviembre 1 de 2011	Tamaño: 140 x 76 x 205 mm	
		univisual2@gmail.com - univisual@cable.net.co