



**YaraVita™**  
**Amazinc™ 600**



10 litros

## AVISO

Lea toda la etiqueta antes de utilizar este producto

# Amazinc™ 600

Fertilizante foliar de zinc y manganeso

Contiene:

35% p/v (350 g/l) de Zinc (Zn)

25% p/v (250 g/l) de Manganeso (Mn)

Floable

Solubilidad en agua - 43% a 20°C

pH - 9

Densidad 1780 g/L a 20°C

Elementos Acompañantes (Límites máximos expresados en mg/kg):

Pb ≤ 50; Cd ≤ 20; As ≤ 20; Hg ≤ 2

Número de Lote: CLXXXXXXXX

Fecha de Fabricación: 05/2019

Fecha de Vencimiento: 05/2021

Fabricado por Yara UK Ltd - Inglaterra

Importado y Distribuido Yara Chile Fertilizantes Ltda.

Av. Pedro de Valdivia 1215 of. 309 – Providencia – Santiago.

Fono(56-2) : 232 57 12

## Atención

H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.


H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P273: Evitar su liberación al medio ambiente.

P391: Recoger el vertido.

## UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS  
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (zinc oxide)



21.05.19

WLCH6901

# YaraVita Amazinc™ 600

## RECOMENDACIONES DE USO

**Almendros:** 1 a 2 l/ha en apertura de yemas, repitiendo con frutos cuajados. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

**Arándanos:** Aplicar 2 l/ha justo antes del comienzo de caída de hojas. Repetir la aplicación durante la apertura de yemas en la siguiente temporada de fructificación.

Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.

**Arroz:** 1 a 2 l/ha al comienzo de macolla.

Volumen de agua mínimo: 30 l/ha.

**Brásicas:** Aplicar 1 a 2 l/ha en estado de 4 a 6 hojas.

Volumen de agua 30 a 200 l/ha.

**Cereales:** 1-2 l/ha. Aplicar al comienzo de macolla hasta segundo nudo detectable. Volumen de agua mínimo: 30 l/ha.

**Cerezos, Ciruelos, Damascos, Duraznos, Nectarines:** 1 l/ha. Aplicar en fruto cuajado y repetir una o dos veces cada 10 a 14 días, seguido de 1 a 3 l/ha después de la cosecha previo a la caída de hojas. Volumen mínimo de agua: 500 l/ha.

**Citrícos:** 3-4 l/ha. Aplicar al inicio del crecimiento de los brotes de otoño y primavera. En casos de deficiencia moderada a severa repetir aplicación 10 a 14 días después.

Volumen de agua mínimo: 250 l/ha.

**Frutillas (en campo):** 1-2 l/ha. Aplicar en el crecimiento de primavera, pudiendo repetir en yemas verdes.

Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.

**Ganado:** Aplicar 2 l/ha justo antes del comienzo de caída de hojas. Repetir la aplicación durante la apertura de yemas en la siguiente temporada de fructificación.

Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.

**Maíz:** 1-2 l/ha. Aplicar entre 4 a 8 hojas. Para deficiencias moderadas repetir esta aplicación entre 10 a 14 días después. Volumen de agua mínimo: 30 l/ha.

**Manzana:** 1 a 2 l/ha en apertura de yemas. Evitar floración. Aplicar 1 l/ha cuando el fruto tiene 2 a 3 cm de diámetro, repetir una o dos veces 10 a 14 días después. Aplicar 1 a 3 l/ha después de la cosecha previo a la caída de hojas.

Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

**Nogales:** Aplicar 1 a 2 l/ha en brotación. Repetir 15 días después si es necesario. Volumen de agua: 500 a 1.000 l/ha

**Papas:** 1 a 2 l/ha una semana después del 100% de emergencia. Para deficiencias moderadas a severas, repetir la aplicación en intervalos de 10 a 14 días. Volumen de agua: 30 a 250 l/ha.

**Perales:** 2 l/ha. Aplicar a apertura de yemas. 2-3 l/ha, aplicar después de la cosecha, durante los 30 días que anteceden al inicio de caída de hojas. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

**Tomates (en campo):** 1-2 l/ha. Aplicar entre 4 y 6 hojas, pudiendo repetir entre 10 y 14 días después.

Volumen de agua mínimo: 30 l/ha.

**Uva de mesa y vinífera:** 2-3 l/ha. Aplicar con brotes de 30 cms y repetir 15 días después. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

**Por favor tener en cuenta que este producto puede dejar un residuo blanco. No aplicar en el plazo de un mes antes de la cosecha.**

---

## SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando este tenga tres cuartas partes de agua y a continuación llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante el tratamiento.

## MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara.

## PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y mascarara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo después de su uso.

## ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y otros extremos climáticos (temperaturas superiores a 40°C) Disponer de los contenidos y envases en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales

## CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a pedido del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.